



## **Zdigitalizowano w ramach projektu „OCHRONA I KONSERWACJA CIESZYŃSKIEGO DZIEDZICTWA PIŚMIENNICZEGO”**




**2007-2010**

Wsparcie udzielone przez  
Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię  
poprzez dofinansowanie  
ze środków Mechanizmu Finansowego  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego



Zrealizowano  
ze środków  
Ministra Kultury  
i Dziedzictwa  
Narodowego



GERARDI L. B. VAN SWIETEN  
dc.

COMMENTARIA

IN

HERMANI BOERHAAVE

APHORISMOS

COMPENDIATA

TOMUS II<sup>us</sup>

Leop. Pöschner



## De Febris in Genere.

Tria communia omnibus febribus observantur  
Phenomena. Horripilatio, pulsus velox,  
Calor; in Febre nempe à causa interna orta,  
quæ ante febrim hæsit in corpore, sive hæc  
ab extra veniat, ut venenum pestilentielle,  
sive ibi generetur, ut bilis corruptio, putre-  
factio in suis vis. Si vero à causa externa  
oriatur febris, ut motu nimio, Horripilatio  
deest. Caloris gradus tactu, & optime  
Thermometro detegitur.

Inhalat febris cum horripilatione horror  
frigoris, rigore, sensim auctus calor ex-  
cipit, in vigore maximus, donec sensim  
decreseat.

Differunt hæc tria, quod magis &  
minus. hæc in ardente horripilatio levis, in  
intermittentibus horror, frigus, rigor. Calor  
sæpe mitis, ut in synocha, ardens, ut in  
febre ardente.



2.

Inter illa tria velocitate, et cum periculo  
decurrant, febris hoc acuta dicitur, quae  
dividitur in acutam, praecutam, et acutam  
ex decedentia.

Si tardius cum et sine periculo decurrant, vo-  
catur lenta.

Suntjam febris, et Epidemica, ut pestis,  
Petitica. et Sporadica, cuius temperies pro-  
pria et endemica cuius regionis.

Haec tria quidem adsunt in omni febre, et  
non omni tempore, excepta sola velocitate  
pulsus.

Quidam essentiam febris, in calore  
statuant, veluti naturam, et in frigore, tum  
esse moritur, ut in intermittentibus, non adesse  
calor; sola ergo pulsus velocitas est signum  
febris praesentis. Licet si a motu, vino, ira  
augeatur pulsus, non febris vocari.

Febris ergo est, motus cordis, arteriarum,  
et auctus.

Causa proxima.

3.

Velocior cordis contractio, à spirituum veloci  
ori influxu pendens, non continuo, ad recursum,  
sic enim nervi dissipati sunt, ut contractio cordis,  
et eodem tempore dilatatio arteriarum, aorta et pul-  
monali, tumentibusque finibus venosis, et arteri-  
lis cordis, comprimere debeant, impediunt influ-  
tus spirituum in cordis musculosem fabricam.  
Simul eodem tempore omnis sanguis ex vasis  
per substantiam cordis diffusus exprimitur, patet  
enim cor in systole. Voluntur quoque binæ illæ  
causæ, spirituum nempe, et sanguinis arteriosi,  
in musculos cordis influxus, in systole.

Illo autem tempore, cum cor repletur san-  
guine venoso in suis cavis, aorta contrahitur,  
et summa in urget sanguinem in coronarias  
cordis arterias, hinc nervi, depletis arteriis  
non amplius compressi, libere transmittunt  
spiritus per nervos cardiacos à cerebro ortos,  
qui cor ad novam contractionem movent, cum  
est in diastole.



4. Acceleratio sanguinis venosi versus cor, ut patet  
in fritionibus, motu, causa est velocioris con-  
tractionis. imò in mortuis animalibus, si infle-  
tur cava u. ductus lacteus, derivato sanguine  
versus cor, resuscitatur ejus motus. prope comotio  
ira, terror, acrimonia cor irritans, augens  
motum cordis.

Incipit gò cum horrigulatione, frigore, rige-  
re, quo tempore pulsus est celer, sed simul  
parvus, tremulus, ut vix sentiatur, cor, appropia-  
mam uestri, tremet, non contrahitur perfecte,  
sæpe pulsus intermittit, cor enim, à copia  
sanguinis, obrutum, non expellit totum san-  
guinem, unde semper quid sanguinis rema-  
nens, cordis tremorem causat; sæpe sub  
tali frigore ager nec audit, nec videt, cum  
sufficiens copia sanguinis ad caput non de-  
ducatur, hinc sufficiens copia aus non  
securantur; pulsus est debilissimus, unda-  
latus, velox et frequens; adeo sumum  
periculum, ne syncope ab obruto corde sequa-  
tur.



Pallor adest in extremis; cor enim debile,  
 nequit ad extrema usque sanguinem propellere.  
 contracta quoque arterie circa finem, retroquebunt  
 sanguinem in ramos majores, unde suborta  
 est in vasis depletionis, pallor. accedit, frigus  
 febrile, frigus afficit omnia vasa. hic  
 homo debilis, viso sanguine ex vena saliente,  
 turbatur ita, ut hypothermiam, pallorem,  
 incadat, cor enim debile factum, nequit ad  
 extrema usque propellere sanguinem. quare  
 saepe ex commiseratione, gaudio repentino,  
 terrore et syncope. cum circula in  
 extremis, attolitur, aperit, frigus sequi neque  
 est. In summo frigore febrili, pallorem comi-  
 scatur lividus color, imprimis in labiis, ob  
 stagnantem in extremis sanguinem, cum  
 cor, vasaque majora sanguine oborta, requirit  
 usque ad extrema sanguinem propellere, reple-  
 reque vascula minima, hic hoc contracta re-  
 cedunt sanguinem in vasa majora, quare saepe

6. sub tali frigore, extrema rigescunt. Frigus  
q̃ ab imminuta & epante circulaōe in  
extremis, minimisq; vasis, facit fibris, vasis  
contractis.

Cum autem motus cordis jam infuset, jam  
vires, similem circulaēm in cerebro, talis  
etiam spirituum seorsis sequatur, patet  
tremorem sepe conjungi frigori, et ab  
imminuta circulaōe in extremis vasis, &  
epanti calore, insensibilitatem.

Sensim tandem vires cordis crescunt,  
resolvunt in extremis sanguinem stagnantem,  
quiescit. Sit fortior, plenior, calor definit,  
quia stagnans in circulum pervenit, corpus  
redit ad calorem natalem, qui gradatim  
augetur; sic in ephemera, synocha simi-  
lior est, acris in putrida, visus  
in ardente. Optimus est calor in toto  
corpore æstis, indicat enim circulum æstem.  
in pejus febribus. Fere semper lethali bus;  
calor sumus circa partes internas precipitur,



Sunt simul extremae frigent, cum crin-  
latio in extremis deprimere incipiat, sanguis  
incubilis, circa viscera stagnet.

### Causa Febris:

Omnia acris, aromatica, spirituosae, Ovae,  
indigestibiles, cruda, dura, ossa rara  
ingesta, ut melones, cucumeres &c. Si pipere  
pinguiter cum cremato, toties intermittentes  
in acutos mutantur. Hoc omnia acris  
medicamenta, venena, ut variolosum, pesti-  
centiale, putridiale, asenicale, viperale,  
serpentinum venenum, reducuntur.

Cibi crudi, duri, indigestibiles, habito res-  
pectu Temperamenti, nullius enim his op-  
tine nutritur, longvel a sumptis cibis deli-  
catiss. Haec cruda non digeruntur, al sepm-  
tus nam suam, mutantur in alcali acidi,  
viscidum, rariatum. neptuna, coctura,  
hemorrhoidis suppressa, venesectiones inter-  
misce, turbatur enim acutis, se, et excretionis



8. iunilium, transpiratio maxime imminu-  
tur. ulcera antiqua, fonticuli, scabellae,  
consolidata, remanent enim noxiam aciem  
in sanguine. alvus, ☐, respiratio retin-  
ta. ☐ nae dui in vesica stagnans, aeris  
fit, eam inflammat, rodit. si vitio renum  
non seernatur, Salinum hoc sanguinem  
infundit, peregrino ob metastases, factos, lethos-  
zum causat. quo major est respiratio, et  
fudor, minus. Dne mittitur, et contra,  
quare hyeme plus migitur, minus in  
estate.

Tristitia minor, maior, turbando respira-  
tionem, sanguinem inquinant, quare a  
maiore, timore corpus pallet, repleto san-  
guine, ob contractam peripheriam, ad interio-  
ra.

Aer nebulosus, frigidus, humido-caldus,  
respirationem imminuendo.

Labores, exercitia consueti remissa, quia  
et respiratio consueti minuitur, et digestio  
vacillat, quare robusti, quiete, otio torquent.

9.  
Iras, motus corporis nimius, aestus nimius,  
Sanguinem exstinguendo.

Acria externe applicatae, ut arsenicum,  
Cantharides, &  $\frac{r}{v}$  di.

Fames diuturna cum humoribus, novochylis  
non demulceantur, acris fiunt, & in putredini-  
nem vergant.

Pus in abscessibus internis & externis re-  
sorbum, sanguinem inficiendo, Hebricos pro-  
ducit.

Aqua Oena in Hydrogicis, cum putrefcit,  
febrem excitat, resorbetur enim attenuata.  
quare saepe Hydrogicam veterem, febris acuta,  
ulcera gangrenosa sequuntur.

Abominabilis motus, putrida, acuta, febris ex-  
citatur in frigidissimo etiam corpore.

Bilis in omni viis putrescens, capitis dolo-  
res, febris facit, quae exempla, vomitus &  
alvus, omnia saepe illius abant, nisi sanguis  
jam totaliter infectus sit.

Vigilia nimia, humoribus acris faciunt,  
corpus exstingunt, idem fit ex studis nimis.



10. Venere, corpus enim debilitatur, abscessus  
non bene digeruntur.

Gangraena, Suppuratio, cancer, quia scab.  
et forbitum putridum, sanguinem inguinat,  
corpus irritat.

### Effectus Febriles:

Celerior sanguinis, reliquorumque humorum  
propulsio, stagnantium in extremis agitatio,  
omnium permixtio, acribus enim partibus  
sanguinis ex corde in aortam pulsus, alius  
conciliatur motus. pingue febris colligitur  
resorbetur, licet nil pinguis appareat in  
excretis, cum Obv. enim pingue missum  
verum saponem constituit, quare Erubra.  
mae febris: cortex, maturatio, subacti  
noxii excretio per Urinam, sudorem, alvum, vomitum.  
Sanorum mutatio in morbosam in  
dolem. hoc venenum variolosum, pestilentielle  
relicthiale, magnam bonorum humorum  
partem in naam sui convertit. Obv. et  
3<sup>o</sup> sanguinis: acriora volatiliora sunt,  
quare sepe Urina acrimas; sanguis dissipatur,



in specie in malignis, quare foetor alvina li.  
 quida, cadaver olens, Salivae putridi saporis, □  
 Talis; Sanguis in se dissolutus, cocturus, eductus.  
 Saepe sanguis crassescit, sic in Lethargis, si egi-  
 nimis sudoribus differant, sanguis liquido or-  
 batus, vincens, diffunditur, obstructions  
 viscerum abdominalium causat. quare folliculi  
 cavebat hinc inde. ne in acutis sudores in  
 caprimenterentur initio, ne sanguis orbatus  
 liquido, incalens in cerebro haerens, phreni-  
 am causet. Sitis, calor, anxietas, dolor,  
 lassitudo, gravitas corporis, ab incaluitate  
 fluidorum. quare Hypocrit. gravitatem mem-  
 brorum in morbis damnant. Saepe febribus  
 diuturnis in specie intermittentibus Sanguis  
 ravescit, viscidus, erudit v. plane acris fit,  
 unde Cachexia, Scorbutus, anasarca &c.  
 Obesi, in acutis periculosi, agitant, obpin-  
 quosum omentum colligatum, sanguini  
 mistum, quare saepe diffinitur venam portae  
 permeans, varia mala causat.

12. Observetur adhuc in febribus, initium, incrementum, Status, in quo crisi contingit, coctus materia morbi variis viis evacuaturs e corpore, et decrementum; cocta quo non cruda materia evacuada, quae insipientis est, crisi initio expectare velle.

Febris in crorem, alium morbum, sanitatem terminatur:

In crorem. initio acrimonia tam febrilis maligna, quam febre nata, vasa solventis, erodentis, sanguinisque incabilis, ea obstruentis, unde anxietates praecordiorum, deliria, inflammationes viscerum, mictus cruenti, convulsiones de lethalia.

In alium morbum. quatenus solida de-  
bilitantur, unde Cachexiae, tumores, pedum, asites, anasarca, leucophlegmacia. Si sanguis inspissetur, rarescat, unde obstructions viscerum, aeris fiat, unde Scorbuthus. quatenus causa morbi non subacta, si febris per se medela suppressa, et subacta licet, crassa



tamen, notis viis e corpore expelli nequit,  
 quare hae metastases in varias corporis  
 partes, & nobiles cum summo periculo, & ignobi-  
 les, facit, aut criticæ, cum ephoria, aut  
 symptomatice, sine cessatione febris, quod malum.  
 unde erysipelas, bubones, paronchies, abscessus,  
 gangrena, &c. huiusmodi. Sic Joemina cepente  
 febre, sensit in manu dolorem, cum fluctuatione,  
 ne, multâ cutis mullâ erat, aperto loco  
 pus effluxit, hoc quod sine inflammatione pro-  
 cedente partibus, depositum febre fuerat, sine  
 dubio quod febre genitum fuit in sanguine.  
 his febre fere sine crisi cessante, viri manum  
 puerulentam ad nates depositam scribere abs-  
 cessum.

Si manû cortex critica crassior, tenuis enim per  
 transpirationem exhalat, ad superficiem depo-  
 nitur & vasa obstruit, vascula proferuntur  
 loca intus & ruptis aut cunctis vasculis ulti-  
 mis, effunditur, quare oriuntur maculae rubrae,  
 pustulae, eminentes extra superficiem, morbi;



144 varicellæ, quæ sunt pustulæ inflammatoricæ, sup-  
puratoricæ, quæ venum, & ichorem, promorbi-  
gradu, continent. Erysipelas &c.

In Sanitatem. si enim febrilis coctus, et  
illa, quæ febre genita est, variis viis criticè  
eliminetur e corpore, tota, nam enim nostra  
nichil peregrini patitur, hinc nec novum  
chylum crassiorum fect sine molestia, sed  
in reconvalescentibus, qui post præteritum lani-  
anxieta, calore, siti, febricula corriguntur,  
et hoc, chylo assimilato sanguini, cessantibus.

Sudore, qui subacta mæa contingere debet.  
quare initio febrinum, siue urticæ, siue pruriti,  
cutis, plane frigido-viscidus, malus est, quia  
criticus, universalis calidus esse debet.

Saliva, in specie in variolis confluentibus  
hoc criticæ fluxus, observatur.

Vomitum, diarrhœa sæpe solentur febris,  
in specie a bile corrupta, ortas, si hæc  
initio febris evacuata non fuit, at diarrhœa

in statu, coctione perfecta, contingere debet,  
cum copiosiora, in incremento innotata  
symptomata, mala est.

Quia sedimentosa, cui tñ semper alia  
evacuatio contingit, ut sudor.

Solvitur sepe, bubone, parotide, erysi-  
pelate, alijs, exanthematibus.

Coctio dicitur, dum materia febrilis crassa,  
sic mutatur, ut agitas evadat expurgari,  
eliminariq. per varias vias, quare omnem  
evacuacionem coctio praecedere debet.

materia q. sunt evacuationes. qualescunq.  
in incremento febris, sine alleviatione  
symptomatum, ex elapsione febris.

### Prognosis.

quo majora urgent initio symptomata,  
eo materia febrilis malignior & copiosior;  
quo citius ad statum properant, solvantur  
citius.

Qui durans febris, materiam rebellem indicat,  
raroz una crisi solvitur, sed recidit.



16. L. statim initio vires subito profluerant.  
Sic, appetitusq, deleatur, periculosum est.

Curatio.

pro. consulatur viribus. cibo, potu, facile dige-  
rendo, gubredini et siti adverso. si enim homo  
sanus a victu abstineret, humorum gubre-  
dinem contrahit, yelos feblicitans, si nichil  
ibi preberetur. dentur sola ynfusula macra  
crem. Rord. avene a succo citri, aceto, panna.  
tedie, emulsiones. ynfusula yungvia ran-  
desunt, gubredinemq; augent, quare vitentur  
sunt et carnes. inf. agri carnes fashouin  
et acida, car ebullitum appetunt.

Si in Junioribus, sibi: aescensibus, viventi-  
bus, febris oritur, gelat. C.C. cum infusio-  
carnium convenit.

*Carminum* *ab* *absente* *febre*, *et* *mitis* *enim* *hum*  
*anguam* *sub* *exacerbatione* *naa* *enim* *hum*  
*morbo* *occupata*, *a* *digestione* *definit*; *copia*  
*parva*, *ad* *reprehita* *et* *6* *et* *8* *die*. *initio*  
*fit* *victus* *plenior*, *in* *incremento*, *stata* *te*.  
*nisi*.

2do. acre, irritans expellatur. si externe ha-  
cero acre, ut vitri, metali, ligni lapidis, opor  
fragmentum, in vulnere, dolorem, febrem excitans  
evacatur. mbeferentia, vesicatoria, caustica  
amoveantur, locosq. mollissimis fomentis fove-  
atur, decoct. aeth. loco. malv. avena, lini,  
arg. proguileonis, rosar. &c. si ex amuleto  
arsenicali applicato, cutis nigrescat, cum  
anxietatibus, amoto hoc, locos emollientibus  
fotato, ceperunt omnia.

Acre internum, ut aqua in chydrops putrescens  
febremq. causans, corrigatur refrigerantibus.

Febres a sex rebus non naturalibus.

Febres a motu nimio. motus nimius distendit sub-  
tilissima, sanguinem condensat, circulo aucto  
o<sup>o</sup> & alia sanguinis volatilifacit, acris facit,  
sanguinem inflammat; imo motu nimio febris  
putrida excitari potest. Una humi fit acris;  
flamma. curatur quiete corporis, humectan-  
tibus, sedulientibus, Op*i*, decoct. aven. loco. cum



18. Succo citri, deinde potius, qm frigide potatis;  
que sensum resolvunt, liquida ablata restitunt.  
Ol. 200 aëria corrigunt. cibi sunt farinacei,  
horz. avenacei, horum cremor, serum lactis &c.

A calore aëris nimio. eye soryis inflamatur,  
in gutta vergit, quare nova epidum subita  
mutatio. sic quidam ex nimio calore in celari  
aëre frigido delatabatur, et totus se obrigit  
dein rheumatismo correptus. aër qd tem.  
peretur transfusione & frigida ex vase in vas;  
& plantis refrigerantibus & modis gravimento  
stratis. interna sunt diluent. humectantia  
decocto cum aceto, succo citri, ribesiorum cra.  
porum, serum lactis, lac elutriatum, & cum  
rosasambur. ribesiorum, diamonon. Cum  
vinum rhenanum Cyathibus 6a diluendum,  
erigit enim vis, putredini resistit, inanis  
enim metus est, vinum & diluendum in febribus  
prohibere. cumq bilis calore, motu accendatur,  
cremor 4ri, tamarindorum decoct. prodeps.

Si cum calore aëris, motus simul concurrat,  
 putridissima oriuntur febres, ut in militibus  
 æstate proficiscentibus, quibus. Tunc aëtocon-  
 venit. vitetur calore nimio, motus, potus &  
 frigida subitus, ne accenso, subito coagulato  
 sanguine, inflammationes lethales orientur.

ab aëre humido-frigido, ob transpirationem  
 interceptam, febres catarrhales, coryza, peripneu-  
 monia, pleuritidis profusa oriuntur. aëre autem  
 humido-caldo maxima oritur putredo, quæ  
 sæpe epidemice febres à tali aëre grassantur.  
 aër igitur corrigatur lignis, herbis aromaticis, floribus  
 juniperi, thure, mast. accensis.

Aër acris, putrefaciens, visceribus ductis, & re pitis  
 & re accensis, aëto supra laminas candentes effuso,  
 Ole. junonis candentibus injecto corrigitur aëris  
 enim hæc capta venenum aëris. Sic Hyg.  
 supradictæ O. O. ligni. aromat. & & re, pestem  
 exstinxit; solum & re novæ pulmonibus.  
 Tormentorum ex pilosis, movendo aërem, multum  
 juvat.



20. In similibus febribus guttibis, venesectionis  
noceat, sanguis enim cocturus, resolutus est;  
prodest initio vomitorium. interne deusta  
aven. Ros. c. aceto, an Ol. acetum bzoar.  
diam, camph. aceto rupta, cort. Peruvien.

Ab animi Pathematibus: hec compeſcantur,  
tristitia per gaudium, ira per quietem, bilem  
temperantia.

A cibis acerbis acidis, siue acida sumantur,  
siue in debili ventriculo aciesant, febres  
excitant, proſunt, opposita sunt absorbentia  
diluentia. Si quidam sumptum arsenicum  
& aqua probata egerit, tartar. deni evasit, nam  
diluentia omnem acrimoniam enervant.

A cibis Oligo febrem oriri, Hantke experim.  
tus, sique hi ob exhalationes salsores, scorbutus  
muriaticos laborant, diluentia optima sunt,  
ut decod. alth. malve aven. &c.

A cibis aromaticis. & piper. & ingib. &c.  
in cremato sumpto, potius intermittentes  
in acutas degenerant, cum siti ingente, oſa

enim horum aromatum armonia per-  
 tinaciter ventriculo adheret, sola non excluden-  
 da, conduunt deor. Cord. avena c. succo citri,  
 et rob. sambuc. oxymell.

A cibis copias peccantibus, non digeruntur  
 enim, sed nam proximam sequuntur, quare  
 in acidum, alioli, rancidum, viscidum mu-  
 tantur; evanescunt quoque foces. ha vomitorio ex-  
 purgante. Si a dissento ventriculo, utramque  
 orificium spasmo stringatur, aer extrahitur,  
 plus distendens, sequitur anxietas, compressa  
 aorta, faciei rubor, oculi lacrimantes, dolor  
 capitis, vertigo, apoplexia, saepe ventriculi in-  
 flammatio, gangrena; dum vomitorium valde  
 periculosum est, ad statim detrahatur sanguis;  
 dein, si opus vomitus provocetur, alius elixir.  
 huius ageratur, interne potus liquidus dentur.  
 Saepe ventriculus taliter dissensus, fit quasi  
 paralyticus, simul vesicae Urinae dissensa, unde  
 Urina stillicidium, ob spumantem paralyticum,  
 dum evacuada non, cibi parum sumantur,



22. et spiritus ventriculus roboratur int. ex.  
herbe ut saccul. aromaticis.

A potu acri fermentante. potus isti in  
actu fermentatōis suppressi, ut vinum, ceris,  
mustum de cholera, dysenteria di. causant, que  
lethales; imo fumus seu vapor horum non raro  
apoplexiam, moribus huiusmodi, qualemque aliam  
suis causat; vapores isti Gas vocantur Helmont.

Potus spirituosus, ut crematum, coagulando sem  
scitōis pressimos produunt. Fermentescen  
tes sumptos potus, diluentia tepida forti  
unt diluendo acrimoniam fermentescentem.

Potatores succipere deservant, non repente  
nec in chydriem cadant di. hic parvis po  
tator, omni mane palpitatio corbis, tremors  
gratibatur, quod omnia sumptis aliquot 3  
v ceporunt. similes enim potus calorem  
augent, vasa stimulant, magis sanguine in  
orgasmodum debuit, vasa replent, quare bene  
sanis vivunt; si vero abstineant a tali potu,  
sanguis non recipit, vasa non stimulantur, fit

q̄o circulas lenta, vasa laxantur, neq̄ bene  
a sanguine replentur, quare tremunt, siq̄ue  
repente absteruant in chydropsen cadunt,  
plus roborantibus, q̄m evocantibus curandum.

A nimis vigiliis. spiritus enim consumun-  
tur, corpus expicatur, bilis fit acrior, atra,  
sanguis aser, crassus, quare a nimis vigiliis  
sape febris pestinales cum delirio, saepe oritur  
mania, catexia, ideo somnus concilietur,  
removendo omnia animi irathemata, lin-  
nentantibus, emulsionibus &c.

Ab exarrendis, retentis. focus alvine,  
Ona, sudor, sanguis hemorrhoidal, men-  
struus, lochialis, fonticuli, setacea, ulcera  
antiqua consolidata, diarrhoea, dysenteria  
repente suppressa &c. retenta, nocent maxime,  
varius morbi viam perunt.

3tio. lentos solvatur. Sape a plethora in  
extremis vasorum stagnante febris oritur.  
Si libenter in juvene plethonico, facies rubra,



24. vixi ullam febrem aduersus, sed tantum debi-  
litate, et gravitatem sumam, secta vena  
primo febris accensa est, repetita venesectione  
cessans. vi. giletonio a viro corpore oblige-  
cente, secta vena primo accensa est febris.  
vi. nimium giletonis: go, ob vasa sanguine  
distenta, febris mitis observatur, sed periculo-  
sa, quae sanguine educto primo accenditur.  
sic in continuis febre, cutis arida, lingua  
siccata, facis rubra, inflata, ob giletoniam.  
febre lentoris causa est acrimonia, vasa  
stringens, circulum, impediens, dum vapores  
per tepida externa superficies admittuntur.  
multum iuvat, quare pulchre prodest in  
ardentibus, ubi cutis arida.

Febris impetus nimis, cum cute, lingua  
arida &c. praecavendus, venesectione in ipso  
febris impetu, in intermittentibus vso die  
intercalari, nisi praesentis in periculosissimo urgens,  
desumantibus. diluentibus. Ops. decort. avenae,  
hordei c. succ. citri, & enini sola non bene

25.  
miseretur sanguini, emulsionibus, opiatibus.  
ac. donec lingua humedori incipiat.

Sequior motus febrilis, cum pulso languido,  
calore parvo, debilitate, qui cause corrigendi  
die, & expedienda iniqua est, auendatur, vino,  
infuso vinoso, deort. melle. scord. ep. scord.

*mirrh. camph. ac. optimum si est vinum.  
si in pleurit. post sanas. mult. si dolor obtusus, melle. si non calor  
debetur, scilicet febris, melle. pargom, qm. est obstruendum. si dolor potius  
est. pargomata mitigentur. si sudor, diarr.*

haec delirium, initio & in incremento mala,  
sunt enim sine ephoria, subtili sanguis  
friolatus coalescit. si vero die critico cum  
coctione in una apparent bonasunt. si  
frigoris extremorum in ardente, in asensu  
vigore fere lethale, critico die seque bonum,  
quia lentor solvi incipit. symptomata  
sunt:

### Frigor Febrilis.

Frigor est sensus quoddam, quae respectu nostri cor.  
poris nil aliud est, quam imminuta vis cessans  
in extremis circulo, aut a lentore in extre.  
mis stagnante, aut acrimonia vase stringente  
circulum, impediens ortum dicens, jam



26. cum sanguis per extrema circulari nequeat,  
accumulatus in majoribus vasis internis, corpus  
obruit, cum obtutum totum excavis suis  
non expellat, frequentius movetur, at debili-  
tatur, unde pulsus parvus, frequens, & qualis  
motus cordis, talis etiam circulus in cerebro,  
& spirituum secretio. vasa extrema frigo-  
re contracta repellunt sanguinem in vasa  
majora, & facile in corde polyposae con-  
cretiones sequi possunt, quae saepe post simi-  
les morbos in motu palpitantis cordis, an-  
xietates, hypochondriacae oriuntur. Cum jam  
per extrema non fiat circulatio contrahuntur  
propterea elasticitate vasa, & rigescunt.  
quo frigoris major, major sequi solet calor,  
nisi moris in frigore contingat, magna  
enim in frigore facta sunt in extremis  
stagnatio, unde major accenditur febris,  
ad lentorem illum, concretiones polyposae  
in interno solvendas. supponit quoque  
frigus stagnationem in vasis extremis, aut

27.  
a lentore vasa obstruente, aut acrimonia  
vasa stringente, at crassa, subtilis enim  
acrimonia horripilatio tantum facit, prae-  
ter acutis. hi intermittentes. vena cum frigo-  
re inhaerent; si vero cum horripilatio incipiant  
biliosae sunt, & facile in acutas degenerant.

Stagnans jam resolvendum, & vasa rela-  
xanda, potu calido The, cort. citri, meliss.  
balneis, vaporibus, fomentis, frustionibus  
calidis, lactibus calidis, plantis, pedum appo-  
sitis, omnia fructuosa vitando, quibus se-  
quens calor accensus, deliria auferet. hi  
magna anxietas in pulmone, vapor de  
sepe attrahatur. o. o. canorih. epigastrio  
illinitus. frigus febrile minuit. Baglio. in  
semibus periculosum est frigus. qui durans, ob-  
ruescant sepe, cordes sanguine obtuto, synco-  
pe pereunt. Tremor Febrilis.

Ep. alterna musculorum contractio, & relaxatio;  
sub frigore febrili oritur ab irritatione perfori  
communis, a qua omnes musculi nervos habent,



28. Tremor minimus frigus et lentorem  
in extremis, articulis, in cerebro turbatum,  
quare sepe, ex compressione cerebri, solet  
ad esse sub frigore febrili. Tremor hic ac-  
tius est, qui in auctis in calore periculo-  
sissimus corpore quieto; si vero sub actione  
musculi v.g. sub elevatione manus, Tremor  
adfit, Papirus est, ex inopia spirituum  
ortus. hic a morbis debiles, post fluxum  
minias evacuationes, tremendi; vino, calida  
to, coffe aperiendi tremendi, hi sumptis cessat  
tremor. curatur ut frigus, cum in frigore  
appareat.

### Anxietas Febrilis.

In frigore oritur a copia sanguinis, in inter-  
nis accumulati, cum per extrema articuli  
nequeat, cor, pulmonem obruentis, calore  
dein adveniente cessans; si tamen, in sonibus  
minimam augeatur, sepe syncope necat, aut  
suffocatione.

In Calore, dissipatis liquidis, mollescent  
Sanguinis coadunatus, sanguis, fit crassus;

qui se sese primo in pulmone manifestat, 29.  
Stagnans in ultimis finibus arteriarum, quo  
pertransire nequit, unde anxietas, anhelosa  
respiratio, jactatio.

Si jam anxietas oriatur ab oborto pulmone,  
et corde, pulsus est debilis, parvus, succussive  
interruptibilis, et parvus, parum enim per  
pulmonem in aortam sanguinis transit,  
unde arteria dilatari nequeat, brevi frigef-  
cent extremae, quia ventriculus cordis sinist-  
rum et tantum tenuiorem partem sangui-  
nis ex pulmone recipiens, eandem habet aorte  
religiosis arteriis, unde ex defectu sanguinis  
in extremis frigus, pulmo intus crasso  
sanguine obruitur cum suffocis, brevi, et  
anhelosa respiratione, ut erecti respirare  
cogantur aegri. huius tria ergo docent pulmo-  
nem infarctum esse lethaliter. hi in mor-  
bis pulmonum, Pleuritidis. Peripneumon. di pul-  
sus decessus, cum anxia anxietate mortem  
inducit. in asthma convulsivo vero cum  
refrigeratione extremorum, cum ex frigore oriatur,  
lethalis statim non est.



30. Si vero anxietas; a denegato circolo, per portae  
ramos; in hepate distributos; cum arterie  
negent adferre sanguinem in abdominis  
infera, isq; rebire per portae ramos; obstrui-  
tos; & spasmo strictos nequeat, dum respiratio  
non est adeo impedita, neque quiescit. Tunc  
debilis; sed circa originem ventriculi superioris  
molestissimus pondus. Sensus praecipitur  
solus ictus sequi, retrogradus bile in sanguinem  
quare item periodum ab hac causa  
ortum, praecedat dolor lienis; ventriculi pres-  
sorius; heparq; sit inflammari, suppurari &  
vomitus obfideri; gangrenari; sic seque  
item diuturnum hepatis gutturo sequi.  
Ius, infarctum enim hepar suppuratur, quare  
aborta dysenteria gutturo non raro ite-  
riis finem praebeat, ob hepar gutturum.  
neq; minus hepar valde affici posse, si emi-  
circa ultimos finis portae obstaculum  
nascaturs, atropis sanguis per coeliacam  
& mesentericas ablatas retrahere potest.

non potest stagnare qd in ramis portae, 31.  
hepat. inflammabil, suppurabil & totum & partem.

Anxietas generis nervosi prehendit hysteri-  
cas mulieres, Chylothoracicos, precebat eam  
ingens copia Bile &c, estq; saepe cum re-  
frigere extremorum, reditq; per porosissimos:  
corripit Senescentes teneros homines, qui cost.  
Pern. optime levantur, nisi visera abdo-  
minalia atra bilis gravelet, tum enim alia  
curatio.

Vir quidam recidivante anxietate laborans,  
levatur statim ventilatione pedis, plurimum  
autem Chylothoracibus ano affixis.

Fere omnes morbi anxietate finiuntur  
nam cor debile sanguinem ad extrema propell-  
lere nequit, simul ventriculus sinist. expul-  
sione obruto primum suscipit, quare frigis-  
cant extrema, simul contracta propria cla-  
sitate peripheria sanguinem versus cor de-  
rivat idq; opplet.

Patecet aut anxietas a frastro minus  
periculosa? quia dum animo inrigunt lingue



32. agri, spasmi solvitur; si in Hysteria,  
dum muscoli quili spasmo trahi aërem  
intercipiunt, qui in loco cadido rarefactus  
tumorem facit in sanibus. cum suffocati-  
onis metu, dum jam suffocari videntur,  
spasmi solvitur; idem in Chylothondria  
is verum est.

Periculosae sunt similes. anxietates ex  
sanguine splisso, concrevisse enim sique, poly-  
posq. difficulte resolubiles facit. Chylotho-  
ndria in et Hysteria, tenuiori gaudent san-  
guine hinc minus ad coactionem prono;

Anxietas in Febris indoz oritur à sordibus  
in ventriculo, et intestinis. harentibus, sive ante  
febrim praesistentibus, sive in febre natis, tum  
vomitorio et purgante opus. si siue hanc  
in anxietate febili cum nausea vomitorium  
debet, siq. metus erat, ne in plethoricis vasa  
rupta violentia vomitus, in cerebro apoplexiam  
causaret, venesectionem promissit. si anxie-  
tates in infantibus, à lacte coagulato, quasi  
gastratione corporis. testantur miseri, vomitorio

& purgante facile curantur. in infante  
 Catarrham suffocationem cum anxietate summa  
 & tepido muci in pectore, terro vomitorio  
 intra dies 6, ex Fro emet. brevi sustuli. muci  
 in ventriculo haerens; in viro, tethana biliosa  
 laborante, feuit anxietates cum sudore frigido,  
 & lypothimis, quae si, cum vomitum contrain-  
 dicantia discederent, cort. Peruv. cum Oleo argl.  
 perfim sperant.

Hoffmannus, & Schmidtus observant in  
 auctis anxietatem cum nausea, sudore curatam,  
 quae proficiente sudore desavit, cessante, rediit.

Si vero anxietas sit à nimio motu febrili,  
 calore, & stricture vasorum, tum emollientia  
 conveniunt, ut emulsiones, Osa, acidula, ino-  
 quata. Teste Sidenham, motum sopiendo con-  
 veniunt.

Si ab inflammatorio viscido pulmone obruente  
 anxietas, disuentia, Osa, clismata, vapor  
 & tepida pulmone tractus, ac conveniunt; ad  
 periculosissimam est, plane si fines arteriae pul-  
 monalis obstruantur, pulsus decreseat.



Sitis Febrilis.

Sitis est desiderium liquidum. oritur in febre,  
 ab incabititate humorum circa extrema vasa,  
 subtilibus enim calore diffatis, et consumptis  
 sanguis coarctatur, incipit exhalantia  
 vasa contrahuntur, inde siccitas faucium,  
 lingue, quare caloris iudicium optime ex  
 lingua nositur; quæ quo siccior, nigrior, nigro  
 rem calorem denotat, vidi sepe crustam nig-  
 ram, gangrenosam ex lingua secessisse,  
 quæquæ est in febre linguam sepe ibidem  
 muric. sem. cydon. cum melle rosarum &  
 oxymelle.

accedit in febre acrimonia alcalina, & pu-  
 trida, quæ irritando sitis ingentis causa est.  
 In Scorbutto muricatio sepe sitis ingens mi-  
 nua.

Acrimonia in ventriculo herens biliosa, cor-  
 rupta, Osa, & sa rancida, aromatica, pu-  
 trida, sapore oris amaro, fastidioso, nauseoso  
 se manifestans. Hæc sitis ingentem causat,  
 quæ quidam potu vel pure non sedatur,

in fere, ex oculo rando-biliofo-orta, ad  
 decol. Herb. avenae c. succo citri, & rob. samb.  
 & oxymell. recit. In, nisi purgante & vom-  
 itorio ha. potes. evanescunt.

Saepe causa pti. ad esp. lingua esp. foia, arida,  
 & hi nulla pti. urget, malum, esp. quia  
 sensorium commune affectum esp. humore  
 invitis etiam agis, potus sufficiens datur.

In febre jam & spiritus & inebilitas  
 humorum, & putredo adest, qd & pti.

Decol. Herb. aven. antisept. cum aeto, succo  
 citri, ou. Ol. oxymell. de propolis. si cum  
 pti. urget. sit debilitas, tuto in febre pro-  
 pinquatur vinum cum cylo & melle, in  
 fere theriacum & anstriacum antiquum, qd  
 vis. erigit.

### Nausea Febrilis.

Nausea i vomitu gradu tantum differt,  
 quae causa vomitus. minima nauseam, aucta  
 vomitum producit.



Cause.

36. Bilis motu febrili facile putrescere, et in ven.  
triculum per apertum laxum pylorum re-  
gurgitans; adeps oris saepe amarus, guttibus;  
lingua sordida.

Mucus: naturaliter tota interna superficies ven-  
triculi, intestinorum, aësothagi mucus obtu-  
tus, ne partes ab aeribus asumptis facile  
labantur; si jam mucus hic crassus sit, &  
copiosus, bilisq; iners, qm uterum dividere  
possit, hic coarctatus fluctuat, nauseam  
parit, sive in ventriculo adsit, sive aësothago,  
et faucibus adherat.

oritur etiam copia viscida, ex cibis mucosis  
in debili ventriculo non mutatis.

Levis horum partium & vicinarum, ut hepatis;  
lienis, pancreatis, duodeni, coli inflammac,  
adeptus dolor cum febre.

a pura imaginatione. si visus cibi immo,  
dis nonnulli nauseant, vomunt.

inordinatus motus spirituum nauseam  
vomitum sepe parit, patet in homine  
infecto, navi vecto & in curru retrograde  
secente.

Bilis si crassa est, crem. Fri, oxymelle, coactas  
evacuetur vomitu & alvo, raro tñ educitur  
alvo, tota. Si sepe frustra conaboream  
alvo evacuari, sit vomitorio opus erat. qñ  
duz tñ St. angl. cum crem. Fri eandem  
sine vomitorio alvo educi; ab eum semper  
metus sit, ne in ventriculo ointur. Necens;  
& corrupta, sanguinem inficiat, qñtorius  
vomitu educatur.

Si vero Hepas ulceratum sit, & vomuiam  
aut abscessum habeat & inflam. ventriculi;  
hepatis vicinarum partium adfit de contra.  
indicanthi, licet nausea urgeat, vomitoria  
vitentur. Si quidam lenta febre cum colore  
subicterico, ex ulcere hepatis laborans, dato  
ob nauseam, vomitorio, utul fufum, ex  
deorsum multam flavam corruptam naam  
evacuaret, tñ in chyrecatarphi cum animi  
deliquis incidit, & mortuus est.

Vomitoria qñ requirunt visera bona,  
sana, non corrupta.



38. mucus incidatur Olibo, aromaticis, oxy.  
melle squib. & vomitorio evacuetur. Si  
vero totus sanguis mucosus sit, ut in Chlorosi,  
Cachexia, Tubus urgente repleto alvo  
exicetur, melius enim est, cum similib. Rebe-  
des, obliuiofi. sint, ne vomitorio, urgetur  
sanguis. Valis ad caput, ingensq. vapor Ethalem  
apoplexiam causet.

In inflam. hoc leviori etiam ventriculi, &  
vicinarum partium, vitetur vomitorium,  
si quidam ex ira, & urio superhausto incidit  
in febrem, Dolorem Cardialgium cum nau-  
sea, dato vomitorio, ante inflam. hoc brevi,  
obit.

Accep. sepe in putridis, peste, nausea  
cardialgica, tum vitentur vomitiona fortia,  
prodest Ra degida cum o<sup>o</sup> amig. S. lini  
ei usq. ad vomitum hausta, qua & Dolores  
sequuntur, & sordes evacuantur.

Acrimonia paucis, quod vomitum, &  
nauseam excitat, tñ in Febribus, quon-  
aliis morbis, ut receptis exanthematibus,  
prodyra ac. profunt quata cum sudoriferis,

apposito simul & pane calente ventriculo & 39.  
faculis & avena calida, plantarum pedum  
lateralibus calidis.

Quare patet, cur initio febrium, ubi nausea  
vomitoria bona? si enim bilis non educatur,  
febre putrescens, in incremento, frangit viribus.  
diarrhoeam causat periculosa, quam si ven-  
ham, frustra quibus sistere tentans, vomitoria  
utrum nulla amplius nausea et vomitus sustulit.

Optime autem prodest vomitorium in  
acutis epidemiis anthrurnalibus, post  
aestatem fervidam, ob bilem adustam;  
in acutis vero epidemicis, aestate, & adulto  
vere grassantibus, sepe nausea à levi ventri-  
culi inflammatione oritur, facilius vomitorium,  
ad hunc semper nausea dolores junguntur.

In ulcere hepatis, nausea est perpetua,  
quia putridum peritum choleocholem,  
in duodenum evacuatam in ventriculum  
regurgitat, nisi hoc corrigatur, acidi, infusio  
in illi marini, nausea non cessat.



## Ructus & Flatus:

Est modo flatulenta, aërea per os cum impetu  
 & sono explosio. in ventriculo, intestinis  
 cibo, potu aër adept, qui extricatus, pressione  
 sua cibos dividere, seu fermentare juvat.  
 dum q̄o plures particule aërea extricate  
 se contingunt, una alteram repellit, inde  
 pendet elasticitas; estq; aëris expansio.

Naturaliter ex in sanguine aër adept,  
 sed divisus, non elasticus, si tñ coadunetur.  
 In ejus particule, fiunt elasticæ, mori  
 sequitur. Hoc quoddam subito mortua, et  
 cor aëre plenum inventum est.

in concussu alcali, et acidi fit effervescen-  
 tia, ingens copia aëris extricatur.

in fermentatione musti, cereris, vini, mifi  
 aër extricatus expirare possit, vas cum  
 impetu diffingit.

Item fit in omni viis, si talis fermen-  
 tantia sumantur, sub quorum digestionem  
 multum aëris extricatur.



# oritur & vomitus a  
convulsione ventriculi  
in Hystricis, chylothron:  
= Diacrisis mea, opio  
sedandus. Item a reusa  
alvin. exanthemat. po.  
= Dogica, et sudoriferi  
videntur. opio opus!

X. horum visum  
Suggerat, ulcus  
Serosus, cancrus  
= mitem chronicum fa-  
= cruid, acrim. ventriculi  
inibando, & mole pre-  
= mendo. si atra bili  
putrida, foetens evacu-  
= et alus vomitu malum est.  
vomitus item in misere  
= re sen passione iliaca.  
a calculo venum. calen-  
= to ductus cholechochi.  
Hernia in conegata in:  
= verso motu peristaltica.  
a cartilagine xyphei.  
= dea depressa ventri-  
= culum premende.  
Colon duri. perconibus  
oppletum ventriculum  
premens. vomitus in  
gravidis, & ciborum in  
hypericis sanis aliis  
v. saburrae biliose,  
rancide, viscida,  
vomitus item saburrae  
= calculo venum, istero,  
vomitus atra bili n  
siptatur, sed potius tepido  
promoveatur.

Hausa, vomitus.  
causa.

Imulit ubi sumpto vomitorio orta diarth.  
putrida, amurlole mae, Dein puro ejecto  
Sanguine syncope obit.

i. Saburra in ventriculo. & inflatio lenior ventriculi, & hepatis, levis, pancreatis,  
duodeni, coli, ea dolore cum febre rosenda. ii. Imaginas videndo quod inuen-  
= di. iii. inordinatus motus spirituum, ut in navi vectis, & in curru retrograde fa-  
= dentibus. #

Saburra in ventriculo hegens vomit. evacuanda; sed si non ea vomitio ab inflatio  
ventriculi, hepatis, levis, pancreatis, duodeni, coli, ea dolore cum febre rosenda. ii. Imaginas videndo quod inuen-  
= di. iii. inordinatus motus spirituum, ut in navi vectis, & in curru retrograde fa-  
= dentibus. #

si a serico hepatis, levis, pancreatis, ventriculi, & tumore cystico in his locis.  
ne ventriculus albis nimis oneretur, siq. & nare ibi sumendi.

vomitur a serico hepatis, levis, pancreatis, ventriculi, & tumore cystico in his locis.  
atrophiam causat, corpus enim nutrimento privatur.

si sericus & alius tumor cysticus in tractu intestinorum oritur impedit plus, minus  
v. totaliter desensum locum, tunc tertio, quarto, & quinto die inverso motu peristaltico  
precedente audiente oritur vomitus cum leuonine, siq. eorum intestinorum plene  
occludatur, alvus nullas facit, vacuat ultra, si autem adhuc sub foeculentia mae  
desensere possit, alvus tarda per dies obstructa est, nancq. edidit foeces.

Humio vomitu in plethoricis sepe apoplexia sequitur, siq. tunc vomitorio  
opus, prius vena secanda. a humio vomitu esophagus rumpitur. vel  
hernia oriri.

si a ventriculo, levis, pancreate, hepate, duodeno, inflatio & febre, vena sectiones  
distend. Osa, elism. Lenia purgantes.

si a sola sensibilitate irritate ventriculi oriata in 7 menth. crisp. cinnam. &  
Oliver. & Absynd. H. succ. lemon. corallij. repetitum.

si a debilitate ventriculi, ubi semicorti & incorti vomendus roborantia  
amara in 7 menth. crisp. & sp. carminat. absynd. comp. & p. Theriac. Andro.  
empl. bac. Lauripatera, facul. aromal. in vino & cere corti, abdomen, f.  
humid. Deplendo lenibus purgant. Coffe nigrum.

si ab acrim. exanthematice, adritica, podagr. rheumat. reusa vomitus et ventri-  
= culus, abdomen molle est, sudoriferac. opio, Theriac. Androm. vesicatoria ad,  
v. prope loca ante dolentia & educta etc.

si a mensibus, haemorrhoid. suppressis vomitus et abdomen molle est, mensis  
haemorrh. revoventur. si gravis in initio ob mensis suppressos vomant, nec  
vomitus cessat, donec foetus grandior plus sanguinis materni capiat, nec  
grave prius mensibus vena in manu secandas.

si a serico ventriculi visum abdominalium, re solis. gumat. exs. cicut.  
acon. napell. Decort. ubor. Taraxac. ac. Diata m. olis. abulere, canero  
ventric. visum adiacentium, nutriendas.

vomitur, pro ruptos abscessus ventriculi, hepatis, pancreatis, purulendus  
vel atroabilianus n. siptatur, Dillucopia tepida dantur. neq. siptatur  
vomitus et hinc in contrahit febribus.  
vomitus a venenis, trochiscis vomitorij, lac tepidum, Osa, oriata  
prosit.

Vomitur a vulnere capitis, & lesione cerebri oritur sepe, & vulnere  
curato cessat.

In variolis, peste, aliisq. exanthematice febribus initio a saburra vomitus  
urget vomitorio curandus. si in exstice eruptio variolis, aliisq. exanthe-  
= matibus in urget, cum inister ventriculus variolis, in peste antraxe, inflatio  
obfusus est, & cavendum a vomitorio.

Item Syngultus in febribus ab eadem causa, ut vomitus oritur, eodem  
modo curandus. Debitas febrilis.

qd. impotentia motus voluntarios corporis tam facile, ut in sanitate, exercendi, go  
virium ad motum defectus.







Loctus ructuum & guttibus, si a putrescenti-  
bus elevetur. & acidulus, vinosus, si a fermenti-  
santibus; & varius, si ab effervescencia acidi,  
cum alicui ut oculi. Et cum acido.

Aër nascitur a ventriculo usque ad anum ad ips-  
um aequaliter distributus; si jam intestina in  
parte quadam spasmo stringantur, proinde  
in loco duplii, aër interceptus in calido loco  
rarefit, unde dormina, tumor, dolor. Si  
ergo utroque officio ventriculi constroito, ab aëre  
intercepto, elasticis factis, cardialgiae quae loaxatis  
officiis, cum impetu explosi flatibus seu ructi-  
bus, & per anum cum sono crepitibus, repente  
remittit. Si jam laxentur, jam constriquantur  
fibrae intestinorum atque oberrans sonum  
edat, borborygmi dicuntur.

At non tantum ex constitutione, at etiam  
ex obturatione, dysenteria intestinorum a  
quarum mai, putris, bile, acido-viscido, foeti-  
bus aër interceptus, facit molestias, dorminas,  
plenitudinem ventris, quae omnia coacuat.



242. Lorbibus: gurgante, et panti v. minuntur.

Air interceptus v.g. in ventriculo, constrictis  
orificiis, v. in intestinis, elasticus: vasa sangui-  
fera comprimit, fibras distendit, inflam. a.  
horemq. & gangrenam causat.

Saepe fibra ita distenta paralytica quind,  
ut ad bonum natem vix reduci possint, si  
sepe volutus oritur, si constrictum intestinum  
in dilatatum intret v. superius in inferius  
inferius in superius, quod melius. Genim vires  
sumptus ita extendit.

Et trisi jam paralysis v. inflam. loci  
adfit, flatibus emissis, et panti omnia. alia  
si paralysis v. gangrena jam adfit, ob fibrarum  
flacciditatem, flatus fronte emittuntur v.  
superius v. per anum, alioq. fronte fluit  
mor. in, ex extremis frigidis, sudore frigido,  
dolore repente et panti, quiesci debili interdum  
tente, facie cadaverosa, facile praedici pnt.

Quare malum est, si recentis flatibus, ut  
colica v. cordialgia flatulenta febris, calor

accidat & enim adept. brevi sequetur infla-  
 matio. imo ex laetis, in albu fermentationis  
 suppressis liquoribus, ob copiam aeris contenti,  
 & elastici facti, ventriculus, intestina rumpi  
 possunt, hinc solis rumpuntur, si aer non  
 pateat exitus.

Ex hemorrhoidibus, menstruis suppressis,  
 flatulentia continue molestant, nullis carmi-  
 nativis sedanda, donec hemorrhoides & men-  
 strua revocentur. haec omnia ex crinolo  
 cento, inegligi per visera abdominis, intestina  
 fibros. intestinorum comprimente, & spasticis  
 efficiente.

Item in chyrochordiacis, Hysteriis, partim  
 ex causa sicca, partim toto digesto, digestionem  
 vitata observatus, unde non mirum, digestiva  
 aromata, roborantia, purgantia nil prodesse.

### Curatio

Dirigatur in maam elasticam, & spasmus  
 & obstruam a sordibus. quare:

Flatus a fermentatione fructuum horceorum, liqui-  
 domum fermentantium, vini, musti, cerei potu si



244. oriantur, tum cepha fermentat<sup>o</sup> sequitur, ab.  
sorberibus, cum semper esse in his acidum adfit,  
item potu calido, decoct. s. anisi, cummin. rad.  
valeriana, cort. Cinn. dr. item magnes. Otri,  
liq. anod. min. rus. O. dulc. frigidos potus  
noct.

Flatus ex fermentat<sup>o</sup> acid. cum aliali, ut  
sepe in infantibus, diluentibus, o. o. omig. dulc.  
quod spicula Onae obtundit, subjunctis laxan.  
tibus, sepe semper enim infantes viscido- aci-  
dico abundant, curantur. Solus infantibus  
crem ex rad. jalopp. magn. O sem. foen. &  
anisi cum  $\frac{1}{2}$  O. proquinae bono cum effectu  
in flatulentis, O. loto vesp. o. o. omig. 3.

Flatus a putredine, cum rutilis, putridis  
amaris, sequuntur acidis, cum O. O. acido  
& siculo, succ. citri, crem.  $\frac{1}{2}$  O. de purganti-  
bus guttae evacuando.

Flatus a spasmo, Soloribus. o. o. sa meden-  
tus, quare o. o. lini ad 10 potatum profuit,  
ubi jam a flatibus gargaris iminebat.

In flatulentis Chylochochondriacorum, Hysteri-  
corum, ex turbato rum motu, ortis, opiate

castor. asafoetid. foetor combustarum ungu<sup>45.</sup>  
lorum conducunt.

Calida omnia corminativa, spiritiosa  
in colica, cordialgia flatulenta vitentur,  
febrem enim accedant, inflammamq, siquē  
ad id levis, augent, sed curatio semper diri-  
gatur ad mām, viscidam, biliosam, putridam,  
indigestam, undam ac flatuum causam,  
nam flatulentia effectus sunt, si colica,  
cordialgie sine febre, cum levi febricula,  
i variis scoribz, ocosis, interpositis purgor-  
tibus, clisteribus cito curantur.

Clismata in gravi flatulentia etiam omni-  
bus injiciantur, sint opposita cause. si  
in scoribus induratis sint cum oleo zermora  
et v. fumo nicotiana ac. aeris, clisteres  
cum helleb. nigro, colocynth. si inflamāo adest,  
v iminet, vitentur.

Externas sint calida fomenta, cataplasmata,  
saculi, cumstil. sicca, ventriculo, intesti-  
nis seu abdomini apposita.



46. Semper h<sup>i</sup> ad provocandam inflammationem  
in simili colica flatulenta, in specie h<sup>u</sup>mos.  
- hoisali, & cardialgia, sanguis detrahatur,  
ex pede, manu à proportionem.

Aibi, & Potus flatulenti.

Fructus horali, melones, cucumeres, alius. aqua  
omniay, condita. Sura, farinacea. cervisia  
in aqua fermentationis suppressa, recens, vinum  
recens, mustum. quare optime cers. lappulo,  
abspat. bacc. junij. cord. anarab. bacc. lauri  
conditur, ut cum his fermentet. venena  
quatenus ob spasmos confatos aërem intesti-  
piunt. h<sup>i</sup> ex arsenico, & corrosivis abdomem  
ad crepaturam tunc. quidam à serpente  
te demorsus, toto corpore intumuit.

Chylochoondriacis hystriis communes sunt  
flatulentia, ob sanguinem difficile per  
visera abdominis, intestina, circulantem,  
tum ob bonum dejectum, & digestionem  
vitiatam unde assumpta propria vi-  
dolem seponitur, acidam, viscidam, o<sup>o</sup>sum  
rancidam &c. tum ob nimium motum

tristatim, ut in Chysochondriacis, Hysteriis<sup>49.</sup>  
sive m<sup>a</sup>, a sola debilitate, & teneritudine  
sensibilitateq; nervorum, quibus est Peruvia.  
roborando genus nervosum pulchre prodest.

### Vomitus Febrilis.

Causa proxima vomitus, est irritatio ventriculi, a  
phagi, musculorum abdominalium, & diaphragmatis.  
remota vero, m<sup>a</sup> in ventriculo haerens, praecurrit  
primo nausea percipitur, os repletur limpha tenui,  
labium inferius tremet, saepe tota maxilla infe-  
rior, per omnia sepiantur, irritati fibras ventri-  
culi, faucium, & phagi, spiritus quodam levis  
cructus contentorum ventriculi, mox totum ab-  
domen intro quasi rigitur, cum vomitu sequente.

Vomitus jam oritur v:

Vitio stom. acti; convulsi, ut in Chysochondriacis,  
Hysteriis: a perturbato animi motu, operati se.  
dandus. inflammati. dum tumentes sanguine  
membrane, cum in spasmum sollicitant. item  
suppurantis: sub suppuratione symptoma inflammatois.



48. argentus, q<sup>o</sup> vomitus. ulcerati: in omni  
ulere dument inflammata plus minus labia  
ulceris, m<sup>a</sup>a acris est purulenta, simul ulcus  
asumptis facile irritatur. Scroph<sup>i</sup> &  
cartilaginosi: Scroph<sup>i</sup> in pyloro contentis  
exitum denegat, simul pylorus cartilagineo  
a<sup>u</sup> fus angustatur. Cancrosi: Scroph<sup>i</sup> canes-  
cens, ob uihorem acrium sibilis ventriculi i<sup>o</sup>i  
tantum vomitum causat. et facile vo-  
mitus ex Scroph<sup>i</sup> ob continuam agitalem  
motum, Scroph<sup>i</sup> canescere facit. Stea-  
toma, Ateroma, meliceris circa pylorum nata  
eundem angustando contentis exitum  
denegando vomitum faciunt.

Vitio m<sup>a</sup>e contentae, biliosa, aida o<sup>o</sup>se  
rancida, visida, aibi indigesti coxia sumpti;  
qui his vomitione excuspi cepit, si in  
infantibus, a lacte coagulato acido & pyloro  
p<sup>o</sup>struita quasi obstructo, frequens vomitus  
Hyp. porracea livida, nigra, putrida  
foetentia, atrobiliana damnabit. vitio

item acrimonia exanthematica, retrograde, 49.  
Sic podagra, erysipelas ac cutanea. Sorbes repressae,  
vomitus causant.

Vitis partium accumbentium. Ventriculus  
inter hepar, liem, pancreas, intestinum colon  
locatur. Si jam in quodam horum viscerum ut  
liem, hepate, pancreate, inflammatio, suppuratio, ulcus,  
obstructio, Scirrhos, cancer, Scatoma, ateroma,  
melius de assint. colon, pericoritis, Suris,  
pyelethum, comprimendo ventriculum, & vomitu  
surgit. Si à Scirrho pancreatis vomitus  
chronicus. à hepate inflamato, nausea, vomitus;  
in obstructione ductus choleochi, urgente cystide  
fellea, post diu. anxietates, vomitus, conu-  
ulsio, repressa, valido hoc spasmo, in sanguinem  
regeritur, ictusque faciat. idem fit à calculo  
renal, intestinorum inflammatio, volucrio, &  
hernea incarcerata in verso motu peristaltico.  
Costilago xiphoidica depressa, comprimendo ven-  
triculum vomitus est causa. Si si à Scirrho  
hepatis, liem, pancreatis ac comprimatur  
ventriculus, cum vomitu sequente, curasit,



50. ne ventriculus cibo nimium opescat.

si vero vomitu noxia evacuantur, ut si  
in calculosis, ictericis, atrobiliariis, non  
sistatur, ad diuentia tepida propinen-  
tur, ut minori cum molestia vomant.

Continuus vomitus atrophiam confert cor-  
pus enim fraudatur nutrimento.

si sine insigni noxia periodicus molestus  
vomitus vig: omni die, quarto & quinto die  
recurrens, dum scirrhus & alius tumor in  
intestinis natus ingreditur defensum cibali  
mole, quae sensum collecta inverso motu re-  
sistit, cum antecedente anxietate vom-  
itu rejicitur.

Aminio vomitu in Pletoricis si opor-  
tet sequitur, quare si in pletoricis, et vene-  
sectione, et vomitorio opus, prius venase-  
ctus.

si viscera ulcerata sint & vomitosa & abs-  
cessu laborant vig: hepar, lien, pancreas,  
tum vomitu gelus lactantur, et lethalis

sequitur Hypercatarsis, hic mulier ictérica,  
sumpto emetico incidit in hypercatarsin  
cum ejectione multa interiore, amara  
mae, per alvum, pueri dem proderat ejan-  
guine, syncope obiit. periculosa q̄ emetici  
si viscera non sint sana.

A continuo vomitu apophagus rumpi  
potest, & heucae oriri. imo post longum  
vomitum observata sunt viscera in situ  
alio.

1. Vitis ventriculi inflammati, ulcerati, scirrhosi,  
cancerosi &c. si oriantur vomitus. Cura defumatus  
ex creatione hominum morborum, ventriculus  
cibi multo & gravi non oneretur.

Vitis mae contentu ortus, curatur mae eva-  
= cuatione, per vomitum & alvum. si tñ ex  
quiesca licet omni mae, vomant, ob sensibili-  
tatem stomachi, quatis opus est. Quis celebre  
antiemetikum laudat, nempe: Et absynth. Rj  
cum succ. lemon. coctil. i. int. & externa  
sunt roborantia, & menth. cis. urinam. ydon.  
& cum vino. vinum iijsum, coffe, externe



52. Theriaca Andromach. facul. oromat. cum  
vino et conveniunt. int. Theria. Andromach. prodest.  
si vitio male acris, retrocessum exanthema-  
tatum, ut sepe in acribus, peste, oriatur  
sudorifica cum opiatis vivant. si sepe  
in acribus, peste, ex podagra recepta, vomitus  
per ore curatur.

Vomitus a mensibus, hemorrhoidibus suppressis  
ortus, venesectione, sanguinis hemorrhoi-  
dalis, mensium revocatione, depulsi. hi  
gravida initio, ob menses suppressos, vomunt,  
neq. apud vomitus, donec foetus grandior  
plus nutriendi capiat.

si Vitio gastrum accumbentium, quae hese,  
siccitate ventriculum premendo irritant, or-  
tus vomitus, curatur horum morborum  
curatione.

Vomitus grossiusculas aposthemata, vomicias,  
hepatitis, pancreatitis, ventriculi, puerulentus,  
et atrabiliorius non sistatur, at tantum  
diluentibus tepidis insistentum.

Vomitus à venenis, ut arsenico, emetico.  
acribus, lacte tepido, o'opi, curandos; imò  
sepe quatis opus. prael jam, cur sequentia

1. Difficultas in acutis sistendi vomitum?  
quia non raro ab inflammatione, ventriculi;  
hepatis; vicinarum partium pendet. sepe  
etiam à lesione cerebri oritur; h' capite  
vulnerati vomunt.

Cur sepe apert facta crisi? ubi variolis.  
in variolis plurimum initio nausea, cordial-  
gia, vomitus, urget, vomitu curandus. sepe  
tū non apert, donec variolæ criticè erum-  
pant. ubi vero facta crisi tū urget, &  
ventriculus variolis obsessus est, sunt quidam  
antrae in Peste obsessi & bilis acrior  
facta cum irritat.

Cur venesectione non raro sanatus?  
si oriatur ex inflammacoe hepatis, ventriculi  
à suppressis mensibus, hemorrhoidibus.  
sepe initio acutorum vomitus, urget, à  
copiā mada, quidam cum cordialgia, tūmp



54. vomitorium prodest, si negligatur, in statu  
periculose excitatur diarrhoea, quam siolent.  
frustra omnibus tentatis, vomitorio dato, hinc  
nulla rogetur nausea, vomitus, sustulit.

Cave h<sup>u</sup> ab emetico, in vomitu ab incipiente  
inflam<sup>o</sup>oe ventriculi, & exanthematibus, ut  
variolis, dum obficientibus, & acrimonia re-  
cipi, ut podagra &c. pendentes.

Primum, si ita roget vomitus, ut nulla  
apertitas retineri possint, quia plerumq;  
ab inflam<sup>o</sup>oe ventriculi, hepatis, diaphrag-  
matis oritur.

Singultus, in febre ab eisdem causis oritur,  
& quibus nausea, vomitus.

Quandoq; vomitus, in acutis criticus est,  
non sistendus.

### Debilis. Febrilis.

Est impotentia exercitii motuum voluntariorum  
hinc jalet debiles, ut se vix movere possint. ad  
motus expeditos, requiritur sufficiens spirituum  
influxus. in acutis jam pendet debilitas ex  
defectu spirituum. Sanguis enim heterogeneus  
non potest bonam spiritibus. Sanguinem, suppeditare materiam.

Cum jam in febribus, postini copia, postini  
rarefactione, postini heterogeneitate, putredine,  
acrimonia, sanguis recedat, patet debilitatem  
depre debere. quare optima cordiaca sunt,  
venesectio, vomitorium, temperatio motus febrili-  
tis et.

Natura nihil peregrini patitur sine noxa,  
proinde cum sanguis sine copia sine inopia, visi-  
ditate, crassitie, sine tenuitate acrimonia  
recedat, debilitas oritur, talis enim faciemendi  
spiritibus ineptam supplevit materiam. Li-  
pro. ex defectu nutrimenti debilitas ut post morbum.

diuturnos, solida enim debilitantur, fluida despi-  
rantur, in morbo corpus non nutritur. humor  
et huiusmodi gressum nimis deficit enim pressio  
sanguinis in Cerebrum, hinc spirituum secretio.  
sudores nimis, sanguis enim crassifertis viciat.  
huius in cerebro heret. Diabete, cum potus, ut  
sumptus est et chylus cum excremitur, in  
locas renes roborantia confertur, ut oxycanthum,  
decorda adstringentia. item revulsiones per



56. albam, sudorem, quo fluente Effluxus  
minuitur. Salivalem nimiam, si peccet  
vasculis & ubi fauces apertis obfidentur, his  
deciduis, Saliva rivulo fluit. Diarrheam  
passionem coeliacam, henteriam, famem  
vigilias, fonticulos, setacea, ulcera de  
glerumq; mias. evacuationes, quia utilia  
evacuantur, hinc corpus privatur nutrimentis.  
Ita, qd debilitas ex defectu.

2do. ex copia sanguinis, seu Plethora oritur de-  
bilitas, hic giletonici debiles sunt, comprimuntur  
cum cerebrum sanguine copioso, qd secretio  
num impeditur, hinc vestigine, supernum  
gravitate capitis laborant. ideo in febribus,  
vertigo, capitis dolor, susurri, cerebrum com-  
primi indicant

3do. ob sanguinem glutinosum viscosum, sepe  
hinc spirituum ineptum oritur debilitas.  
fit in Catarrhis, chlorosis de morbis frigidis.  
quare pallent ob defectum rubore pathi sangui-  
nis emariantur, quia puriores effluunt plane  
intumescent deematose.

4to. si sanguis acrimonia peccet, ut alicuius,

putrida, biliosa ut in acutis, exanthematicis, 54.  
febris putridis, malignis, qui saepe ita resolvitur,  
attenuatur, ut coccineus. Tenuis, effluat, ut patet  
in longo ictero, variolis. Sna, muriatica,  
ut in Scorbuto muriatico, viscido-acida, ut  
in Sali Scorbuto. alicuius putrida, ut in  
ulceribus internis, canceris, dum pus & ichor  
reabsorbetur, sanguinem inquinat. atrabiliosa,  
sic atra bilis mota reabsorbta, calidissima  
febris excitat, in frigido etiam corpore.

Omnes haec qualitates sanguinis, aut impediuunt  
seu spiritus, aut magis spiritibus secerne  
consumunt, sanguinem inquinant, unde corpus  
consumitur, emaciatur. Li

Sanguis multus & inflammatorie fipus. Cerebrum,  
difficilem facit circulum, vasa longiora cerebrum  
comprimunt, qd se excretionis lente sunt.  
Sanguis glutinosus, acrimonia gravemque infu-  
tus, item deficiens, parum habet mae aphe-  
secerne spiritibus, qd debilitas.

Sto. a mea in ventriculo herente subita, ino-  
syncopica, urget debilitas, qua vomitu exaspera-  
tapat, ut in acutis. hi etiam a veneno sumpto



58. *Summa debilitas. in malignis, Pestilentiali-  
bus videtur omnino a venere subtilissimo  
infusis spiritibus, quare subito prosteruntur  
vires, cum insolidis spiritibus aut paraspime,  
aut vitiosis influant.*

Curatio.

1. *Debilitas ex defectu nutrimenti, post nimias  
evacuationes, repletionem curetur. conducunt  
alibi concoctus faciles, carnosus, juscula similia  
cum succo albi ut tollatur prolixitas ad  
putredinem, ut carnis bubula, vitulina ovilla  
galina, non adeo pinguis, cum cost. albi, muce  
mosch. Lac calidum, crem. horz. avena. vinum.  
in debilitate. In post nimias hemorrh. caute  
cum vino agendum, ne recrudescant hemorrha-  
gie, hoc etiam ex hemorrhagia in acutis  
orta debilitate videntur juscula carnosae  
ne putredo, quae in febri jam adest auferatur.*

2. *Apletora debilitas curatur venesectione  
Scarificatione, dieta parviori, & potu di.  
3. Debilitas a sanguine glutinoso, et in lachry-  
s. hici, curatis morbis his. aptat.*

4 si ex acrimonia sanguinis <sup>3</sup>gliumz oriatur debilitas, sanguis corrigatur deoat. acrimoniæ & oppositis, si in resolutione sanguinis heretica deoat. hord. aven. serum lactis & c. conduntur; idem in pure resorbto ex abscessibus, sanguinem inquinante.

5. maa in ventriculo herens, debilitatis causa, venena, evanescit, corrigantur.

Sæpe post morbos acutos, infrenie phrenitidis curatam, debilitas capitis, delirium prod. idem, gravitas, sopor & remanet ex pura debilitate, ad mala hdi dicta bona sem. fini ceptant, quare novia opent evanescant, ut purgantia, vesicatoria &c.

Cos in febri suis debiles, vix roborari pnt, cum nunquam quiescat.

Pateb jam, quam impudente jactentur et prescribuntur Cordiaca varia in debilitate in morbis, quæ gelidissima, aut post absorben. tia, aut calida, nichil proficiunt; abla. ta! causas, hinc morbo. apante, optimum cordiacum est, bona dicta.



Calor febrilis.

Calore Olie, et o<sup>o</sup> sanguinis attenuatur, & exal-  
 tantur, quare  $\square$  est rubra naturaliter. sic homo si  
 cibo, et potu abstineret, ex eadem causa,  $\square$  nam emittit  
 nil rubram.

Subinde in in acuto; cum calore primo  $\square$  est  
 pallida, & praesentitidem futuram indicat, quia o<sup>o</sup> et  
 Olie sanguinis exaltata retinentur, ex proprio re-  
 -num, caput, gelant.

Quondam  $\square$  pallida, decolor, in febre valida, si-  
 nimio potu & singulis dependet, quare cum o<sup>o</sup> is  
 sanguinis exaltati si miscetur, quare potu sopora.  
 -eo quare est.

Calor ab attritu, seu actione vasorum in  
 sanguinem, et sanguinis acri in vasa, hinc aliorum  
 circulo dependet. globuli enim sanguinis velocitate  
 per vasa pulsati attriuntur; Langui in, ut calor, seu  
 febris valida excitetur, densus, crassus, esse debet, nam  
 quod duriora corpora mutuo attriuntur, major calor.  
 sic in febre acuta, biliosa, magnus calor; in  
 resolutione, putrida, Lethia, ubi sanguis coctus,  
 resolutus, educitur, calor minor.

Confusus sanguinis nositur, ex temperie acri, san-  
 guine inflammatorie fuso educto, pulsu duro,  
 ac si solidum per arteriam preloretur; hi labori-  
 osi, rustici, denso gaudent sanguine, puellae  
 chloroticae tenues, viscido, cum multo sero. saepe  
 in otiose foemina, pallida, tenera constituta,  
 tione inflammatorie fuso sanguinem possident.  
 in nobili foemina, tenerissima constitutionis, facie  
 pallida, pleuritide correpta, sanguinem vena  
 eductum, cordacum, spissum mirabor, idque  
 saepe in proxi expectus sum.

A Plethora saepe febris suffocatur. hi Sidenham  
 Juvenem acuta correptum febricitare vix observa-  
 vit, educto vena sanguine febris primo accessit, et  
 postea repetita venesectione cessavit.

Corpora exercitata, laboriosa, ob sanguinem densum,  
 facile incensibiles, gravius febre decumbunt.

Calore  $90^{\circ}$  et  $91^{\circ}$  et a missum in per Japonis exit  
 e corpore, hi a sudore ob  $90^{\circ}$  subtile manilex flavo-  
 centes in induratis. globuli rubri coadunantur,  
 sanguis evadit crassior, imo majore calore serum  
 coagulatur, quare, in acutis, inflammatis, in statu



62. morbi, oborta lethales, tum ob vires debiles,  
tum sanguinem crassum vix resolubilem, hoc  
dysenteriae angina accedens, lethalis, ob  
sanguinem, liquidis alvo subductis, crassum fac-  
tum, irresolubilem, viresq; debiles.

Olia, oco sanguinis attenuata, acciora sunt,  
unde Ene rubedo, imo Ene si sanguis in  
putridum alcali vergat, foetet. unde fac semper  
incubilitas, crassities sanguinis & acrimonia, se  
in pulmone, per respiralem difficilem, et cerebro,  
per deliria, manifestat, quae symptomata sepe  
Ene praecedunt alba, vix, ob stenta rerum vase.  
Solida sicca, rigida sunt, quae in ardente, cutis,  
linguae, oculorum, siccitas, ariditas, scabrities,  
calore immo liquidis diffatis, consumptis, sanguis  
torretur, crassus fit.

### Curaatio.

Cum in febre sit crinitas aucta, densitasq; san-  
guinis inflammatoria peccet; quare quiete mis-  
seri, venesectione, etiam, si calor hac celebrata  
non minuitur, & augetur, repetita quodq;  
ad animi deliquium usq; hoc referuntur

ligatura arduum inferiorem superiorem 63.  
leviores; ne totaliter vere, similis arteria  
compressantur, alternatim administrate et  
per mediam horam relinque; ne sit sita  
alias ex totali compressione venarum similis  
arteriarum circulus in parte sisteretur, cum  
gangrena sequente; retineat de venosam  
sanguinem in parte, ne tanta copia versus  
cor euat, hinc calorem minuant; valent ma-  
ximè si repetita venesectioni non cedat  
calor, hinc obviis fructus debitori amplius  
nequeat, ideo tantum usus sunt in hemor-  
rhagiis minimis.

Interna sunt sedentia non actu frigida  
sed temperata, ut densatus sanguis solvatur,  
vasa stricte laxentur, deord. hord. avene,  
aniseb. diss. Veri. cum sacro atri, aucto,  
in Ol. Zni. infusio ubi resolutio sanguinis  
ob putredinem metuitur, cymel, hydromel,  
emulsionis s. s. c. s. papav. alb. Olro.

Aqua sola miscetur sanguini ob o<sup>o</sup>  
sanguinis resoluta, sed per diem elabitur.



64. quare Saponaceis decoctis opus est. ne tamen  
calor ita temperetur, ut plane sepe, aliis  
non minus sepe coquenda cause morbi.

Cutis ex pulverinosis, calor item cutis  
si videtur, ne calor internus huius augeatur.  
imò aer estivus calidus, transpiratione & de  
frigida ex vase in vas, refrigeretur, pavimen-  
tum herb. refrigerantibus conspergatur. imò  
in aestu maximo sive huius opus, laud-  
lyp. commendat.

Ubi vero magna cacochymia sanguinis  
caloris causa, ut si Scorbuticus, Melancholi-  
cus, ex atra bile mota, sanguini mixta,  
febre corrigiatur, & calor sit resolutivus,  
putridus, ut in Peste, Petechiis non raro  
in quibus sanguis coarctatus, cum damno,  
eductus. Iam venesectio nociva non  
solum enim hac, cacochymia, ut opus  
est decoct. mucilaginosi c. aucto, in Pl. de.  
Pessimum est, si obesi febre corrigiantur  
pinguedo enim febre coarctata, resorbata,

rancescit, sanguinem inguinat, unde Dna  
 rubermina, humefers, sudor pinguis, indusia  
 colorans, sepe pinguedo haec diffinita venam  
 porta & pulmones permeans, eos obstruit; debet  
 qd potius saponaceus sufficiens ut de cord. hord.  
 avena cum O. puro atr, aucto, rob sambur.  
 oxymel, lac ebulliatum. simul pinguis.  
 Caerthimia, si e p, evanescit, ne venefactionem  
 Samarit. coem. In albo, vita magna  
 copia o'ofi hujus rancescentis odicitur. p'ijem.

Cur auras sepe in putridam degeneret?  
 Dum Oia, & o' sanguinis acriora sunt, se  
 rum coagulatur, dum diffilatur, unde Dna  
 Stranguosa foetida, sudor foetidus, alvus foetida.

Cur calor levis in calore sumo noxius?  
 Jaceat qd ager leviter tectus, neq' p'isulis p'ini-  
 goibus oneretur.

Cur sepe arida vitalia viscera, ut pulmones,  
 hepar, lienem major calor, q'ndq' dolor percipiat?  
 quia sanguis stagnare incipit, inflammationem  
 lethalem minuat.



66. Putredo non est causa caloris; corpus enim  
putrescens callescit; sic in gangrena puti absque  
calore, factor tamen putrescens adest. ad calorem, ex  
pauca acrimonia stimulante ortus, fungo-  
nem putrefacit, plus, si materia sit maligna, pu-  
trefaciens, ut in Peptis, quare bene acida dan-  
tur putredini resistenda.

### Delirium Febrile.

Si absque affectione externa nervorum, variae  
ideae oriantur in cerebro, delirium dicitur,  
quod a causa interna nervos, sensumque  
commune mutante, hinc ortus. Talium idearum  
non respondet causae externae. patet  
in insomniis.

Si in primo delirii gradu, excitatur idea  
aegri, ac si extra corpus visceret, audiret,  
admoneri tamen ab absentibus, degerit se ob-  
servant; si vero fortior sit sensuum affectus, pri-  
mitus affirmant ideam ortam veram esse, si  
negetur ipsis. Haec, irascuntur.

Legit ipsipina, ideo excitantur, quae in  
sanitate in personam debuerunt, quare  
quibus soni occupabantur, de his infirmi de-  
lirant.

Pro ratione ideo excitata, animi affectus  
sequuntur, ira, indignatio, metus, timor, tristitia  
hic de. Hi sunt furiosi, exiliat, obvio  
aggressuntur, se laedunt. Si ideo excitetur mi-  
ra, quae antea magis in sensorio praesens fuit,  
attoniti, lacrimae, gemitus, vultus eorum  
admiram, et metum exprimit, periculosum  
est, convulsiones enim succedunt saepe.

Causa proxima est affectio medullaris substantiae  
cerebri, inde enim omnes nervi originem ducunt,  
et in medullam oblongatam continuant, una  
cum nervis a cerebello ortis.

Causa nervos mutans, obstructio vasculorum,  
nimis proteritus humorum, circula<sup>o</sup> deniq;  
vitiata, unde turbatur spirituum secretio.



Humia ergo velocitas humorum per cerebrum,  
 stagnatio, obstructio, inflammatio, congestio, quibus  
 circulus & secretio spirituum turbatur, nervi  
 noventur.

Rege delirium oritur, ex sordibus in ven-  
 triculo herentibus, quae se ex lingua sordida  
 sapore amaro, putrido, nausea, manifestat.

### Curatio.

Calorem temperantia, Olla, Sedentia. item  
 revulsiones, derivantia, quae cerebrum per-  
 quire copiose liberant, cum in alia parte  
 cedunt ad pediluvia, involutions. pedum  
 in lintea tepido-humida, frictions. pedum,  
 epispastica, vesicatoria, clipes, qui laxando  
 intestina, sanguinem a capite revocant, qd  
 incipiant ex h. mod. O. omni hora, donec  
 mitescat delirium. caput fovetur aëlibus  
 diffectis, episthemat. emollientibus, ut in mod.  
 In vasa externa major fiat affluxus, per  
 quibus per carotidem externam ad exteriora  
 minor ad interiora.

Quando erythemata ex v. frigida, sunt  
in dolore capitis, ita in delirio juvant, in  
specie in febre biliosa, cave ad his in exan-  
thematicis, quia aptum demergant refrigeran-  
do.

Optime delicia, sine calore nimio, cum  
lingua humida, signant vesicatoria pe-  
dibus applicata, id est his expressum, quibus  
sunt multum malignitatis eductur, et exan-  
themata, si adsunt in sanguine, expectantur.  
sunt ideo doloris, ducta in cerebrum, delect  
ideam delirii.

Interna sunt seductia, Osa p. r. camphorata,  
emulsiões, in nimio calore opitata, que  
sanctore in delirio maniacis, melancholicis.  
profundum somnum provocando, quo saltem ad  
demergens ideo gravior delectur, viresq. somno reso-  
citantur.

Huc succedat venesectio in pede, plures deli-  
cantes sine febre, solasse venesectio pedis  
restitui, nil juvante venesectio in manu.



70. Hemorrhoidum apertio, si nāa inclinat,  
ut si eyes ante obnoxius his erat, dolor, rubor,  
punctus circa anum adest, tum balneum  
pori & cataplasma. emoll. foveatur anus; si  
non prodeunt, suppositorio ex Ole. gema cum  
melle et aloē provocentur, dein affris ficius  
foliis foveantur & lanceola, aut hirudinibus  
apertantur, & sub fluxu eyes infuset vapor  
de lyrida.

Crenatorum provocatio per pediluvia  
frictiones, emplastia, vapors. De lyrida, &  
venesectionem in pede.

Si vero delirium post febrem maneat, cum  
pulsu parvo debili, evanescantia vitentur, est  
enim ex debilitate, prout. dein bona dicta  
apans, & roborantibus.

Subinde fortis sensuum affectione externa  
interna idea delirantibus. Delirius. Si deli-  
rans, audens concursum hominum, dum  
vicina domus ardere, respicit. alius audiens  
& gustatum in dream pelvum cadentem sonitus.

quidam petunt musum, alius contum, huius  
 concessis respicere. quare non frustra Velles  
 in delirio melancholicis, maniacis, purgato  
 prout ab atra bile corpore, videntur vespera  
 bona, corpus alius sanum, variis ita turba-  
 runt corpus, ut deleatur idea praesens quies-  
 sima, non ita, ut eduerentur humores, sic  
 purgantibus, vomitoris fortibus, vesicatoris,  
 contrariis actualibus, ponticulis, setacis,  
 clasmaticis fortibus, submersione in frigida,  
 nisi sunt, ut dolore excitato, idea deleatur.

Quidam cantharus magna doli, alii mosto  
 nisi sunt, ut huius generis antipima deleatur ide-  
 am.

Locis delirantibus Temperatus eligatur, ne-  
 minum lucidus, neq. tenebrosus. hic quidam  
 delirans cum idea hostis se inferentis in  
 tenebris deliravit magis. Delirium quo meli-  
 culosum populat locum lucidum, furiosum,  
 tenebras, ardeantur persona, quas ferre aeger  
 nequit.



Coma Febrile.

Somnus est ille status medullæ cerebri, sulcus, nervi non accipiunt tam copiosum, nec tam fortem influxum spirituum, qualis requiritur, ut organa sensuum voluntariorum suas actiones expedite peragant, est ergo spirituum influxus à cerebro in nervos, et à nervis in cerebrum impeditus, in comate.

In Comate Vigili, videtur esse per loca quodam influxus spirituum expeditus, per alia vero impeditus, quare obdormiunt quidem, sed ob inordinatam secretionem, et influxum spirituum turbatamque sanguinis in cerebro circulationem, evigilant brevi cum terrore quodam, et convulsione, dum fureti spiritus per plura loca repente in nervos sensibiles currunt. Si vero dormiant plurimum, Coma Somnolentum dicitur morbus.

Causæ.

Evacuatio nimis, per hæmorrhagias, alvum, vomitum &c, non pulsitur crani sufficiens sanguinis quantitas in cerebrum, quare somno

Tali seque convulsiones ex inanitione procedunt,  
vasa enim non repleta, propria officio con-  
trahuntur.

Repletio nimia. Si pletionii sunt somnolenti,  
si, segnes; comprimitur enim sanguine cerebrum,  
secretio spirituum impeditur. Huc:

Repletio ventriculi nimia fruat, prius aorta  
descendens comprimitur, caput ita sanguine re-  
pletur, ut cerebrum comprimatur.

Sanguis v. infidus; ut in Cachectis & inflama-  
tione suppur. secretio spirituum impeditur, et  
cerebrum comprimitur.

Cerebri compressio, ab extravasatione san-  
guinis, feri, depressione crani, tumore varis  
in cerebro natis, exostosi crani &c. soporem  
causat, quo jam causa major, major sopor.

Si membrana nervorum in exorta medulla  
oblongata inflamentur, medulla comprimitur,  
spiritus sancti in nervos infusa nequeunt;  
in Febre

Sopor, ex sanguine copioso, supposito, calore rare-  
facto, incabili, cerebrum comprimente oritur.



Post evacuationes nimias: otum soporem curant  
blanda nutricia.

Sopori à copia sanguinis: venesectiones, Scarifi-  
cationes, purgantia, pediluvia conducunt.

Si à sanguine viscido, lento, proso oriatur,  
ut in Cachectis, curatur morbus primarius.

Soporem à ventriculo opplato, venesectione  
premissa, curat vomitorium.

In sopore à depressione cranii, extravasa-  
tione sanguinis ac. vide Vulu. Capitis.

Sopori cum febre, subveniat rempessiva  
venesectione, Scarificatione scapularum, qua  
sepe delirium febrile, leniorem soporem  
sustulit; phlebotomi item effectum observavi,  
ex applicatione hirudinum post aures: tam  
in delirio, qm sopore, item vesicatoriis pedi-  
bus appositis, epispasticis pedibus & cervici appli-  
catis.

Sidenham observavit leve delirium soporem  
sepe praecipere.

Chymata etiam repleta conducant; interna  
sunt etiam temperantia. Opa, acida.

Si delirio coma faueat malum, augetur  
enim cerebri compressio, hinc delirium succu-  
dens bonum, indicat enim compressionem minus.

Silentium, si coma cum ingenti effluuiis,  
redit interne temperantia, narcothia, emulsi-  
onem ad estum temperandum.

Infantibus in variolis, torpidis, et soporosis,  
bono cum effectu applicatur vesicatorium Cervici.

Talia quoque sunt in Soporosis, quae sensus externos  
afficiunt, ut ad naves: ans. Et. X. C. C. succ. aul.  
mentum, vesicat. ejusque. cauteria &c.

Ne ex demibitu longo, opus fieri, corripis  
gangraena sequatur, Libris in lecto frequenter  
mutetur.

### Peruigilium Febrile.

Ep. Somnolentia contrarium, in quo organa  
externa ab objectis facillime afficiuntur, hinc  
libet dormire vellet, non possunt, quia a con-



96. *Humores cerebri irritatōe, hinc actione fibrorum  
cerebri turbantur, suntque nervi ita sensibiles.  
Ad minimū objecto externo, juxta sonum, irritan-  
tur.*

Causae.

Dolor, quo praesente, ideoque continuo in cere-  
brum delatus, id turbat; anxietas, terror, humor,  
ira, cura, moestitia, desiderium rei cupis-  
sime. Ut foeminae motib. infusa, vigiliis sunt,  
chloroticae fiunt. non foeminam motib. cu-  
pidam continuo vigilem cum cathexia sequente  
que, propter viam nuppiet, brevi sona facta.

Quae ex animi pathematibus ortum ger-  
unt vigiliam non curatur, nisi haec removeantur,  
dura mater enim hic, et cerebrum continuo iri-  
tatur, hinc spiritus in nervos continuo de-  
terminantur.

In febri vero ortus ex nimio obestum,  
prolapsu humorum, hinc continua dura mater  
et cerebrum irritatōe, pressio, spirituumque in nervos  
determinatōe, fortis ex irigiente cerebri, et  
durae materis inflammatōe.

Curatio.

Curatur, a spiritum temperantibus, sedantibus;  
 Opio, acrio, quiete, animi affectuum evitatione,  
 demulcentia in loco tenebrioso, emulsionibus pa-  
 paveraceis. ext. episthem. ex emuls. s. pop. abbi;  
 nucleor. persicorum, addito O. camph. aell. rofar.  
 & Cataplasma. ex pane similag. pop. alb. in lacte  
 cortis, addito modico croco. possunt tempora in-  
 ungu. ungu. Populeon. alabastr. Somnifero. pedis  
 involvantur in lintea tegulo. humida. alia;  
 ubi biliosa febre, episthem. frigidum ex V  
 ros. & pura c. O grobeff. & Cataplasma. frigidum  
 ex pane, aucto. sem. cumin. Ole. ac.

Si a spiritus internus minims. sed, quanta pruden-  
 ter data, conducunt.

Convulsio Febrilis.

Est involuntaria & quorundam, & omnium masen-  
 corum visus. pro tendines contractio, a preternaturali  
 fibrorum oscillatione pendens, ob influxum spirituum  
 copiosius determinatum.

Omnium musculorum voluntariorum actio  
 pendet a cerebro, proinde, si convellantur, causarum



98. Degravate actionis a cerebro determinatur.  
que etiam plurimum, in febre, in cerebro heret.  
huc in convulsione a vulnere, causa sepe fit,  
et nervus pericranialis, tendos paretus, discipus,  
arsenicum vulnere infusum, hemorrhagia eno-  
mis, &c.

Eque causa heret in ventriculo, sic Gallenus  
convulsiones in acutis, sine signis cerebri affec-  
tus, observavit, humore bilioso vomitu rejec-  
to, cessantes. quare a venenis, arsenico sumpto  
et convulsiones observantur. infantes, ex  
sordibus primorum viorum committuntur convul-  
siones, quibus, clismatibus, purgantibus, vomita-  
ris eductis, cessant convulsiones.

Soloribus nimis convulsiones non raro succu-  
dunt, ut solori dentium, otalgia, cardialgia,  
colica &c. infantes difficulter sentientes facile  
convelluntur, ex torminibus epileptici flunt.

Qui debilitudine, et debilitate nervorum,  
sensibilitatem laborant ex levi causa convul-  
suntur, tales sunt Chylothoridici, Hystrici,  
nobiles delicate educati, infantes.

Solusque a gravi causa convelluntur, ideo <sup>79.</sup>  
periculosum est.

In febre convulsiones oriuntur, dum valida  
febre agitata, rarefactus sanguis, cerebri actiones.  
turbat, hinc neccessario inordinatum spirituum  
influxum in nervos causat; hinc cause delirii  
comate, perigiliæ febrilis, sunt etiam cause,  
ob irritatæ nervorum, convulsionum. quare,  
delirium, coma, perigiliæ, si sit cum substat.  
In tertium, dum pulsus largitus, et hæmorrhæ  
actio, futuram convulsionem præbuit.

Sæpe in acutis initio morbi convulsiones,  
epilepsia comitantur, ex fortibus primarum viarum,  
precipue in infantibus, sensibilibusque, qui  
voraciter cedunt.

Horatio ante eruptionem exanthematum  
urgent, quibus expressi cessant, plurimum id est,  
in variolis infantum.

Si vero presentibus exanthematibus, cum delirio  
comate, perigiliæ, comate vigiliæ, convulsiones  
accedant, lethale plurimum, nervorum enim  
initium irritatur; hinc cerebrum affectum esse constat.



Nervi singuli, motibus voluntariis inferentibus,  
 & sensationi, oriuntur à cerebro, vitales nervi  
 vero à cerebello. hinc non ramulus à ramo,  
 ut arteria, vena, sed singulus nervulus à cerebro  
 & cerebello ortum habet. multi jam simul  
 combinati in fasciculum, una comuni inveſti-  
 untur membrana, omnis generis vasculis gan-  
 -dente, quæ à dura matre ortum ducit, eſt  
 vera dura matris continuatio, pulposum  
 nervorum inveſtiens; unde ſi ab extra nervus  
 afficitur, propagatur idea ad locum cerebri,  
 ſeu ortum nervi, ſi idea doloroſa ſit, con-  
 -vulſiones excitare valet, ut ſit in dolore  
 vulneris, tendinis, nervi ſemidiſſiſſi, puncti,  
 criſtati, ubi dolore dentium, auris, dormi-  
 -tibus infantum &c.

Oritur jam quæſtio, an idea veg: doloris  
 externe nervo impreſſa, in pulpoſe nervi  
 ſubſtantia, an in membrana à dura matre  
 procedenti, ad cerebrum, motu ſpirituum,

an tensione membrane propagetur? hoc  
certum est convulsionibus, relaxantia emolli-  
entia plurimum prodepe. vid. Bagl. qui  
variis spiritibus, acerbis, membranas irritando  
convulsiones, et copiose relaxando, paralyss. in  
animalibus vivis produxit.

Ubi semper convulsiones periculose sunt, hi  
melius eos oriri a saburra ventriculi, dum nervi  
in aliis visceribus affecti, crispati, ibidem ad  
cerebrum deferunt, quam si nervi in ortu in  
cerebro afficiantur.

Præputia convulsio est ab evanescere nimia  
Cum enim major vis, Positum solis ovum sit  
superius fluidas, quare his deficientibus, propria  
fronte solida contrahatur.

In robustis, senibus periculosior, ex valida causa  
enim oritur, quam foemina, juvenis, minimum sensu-  
bilibus.

In juvene aucta decumbente 6 die morbi,  
subfebris tendit ad agram, sequebatur tremor  
totius corporis, 14 die totius corporis convulsio,



82. rodie a prout omnia. poro non semper le-  
thalis: sunt convulsiones, dumodo cerebrum  
affectum non sit. Li vi examini putrema-  
te, sine febre delirio iniepit, sorore premi,  
statim cum subfultu tendinum, et uba die  
obit. ideo convulsio delirium sequens v  
coma v per vigiliam, in specie in aucta cum  
flore continuo non alleviante, subfultu  
tendinum, tremore, lethalis: quia a sangui-  
ne vasis cerebri impactu, febre rarsa et jam  
medulla cerebri afficitur.

Meninges, et substantia corticalis: lesi: potest  
sine convulsione, vi. Vulu. Capitis. quamprini-  
mum vero substantia medullaris: leditur, statim  
convulsiones: sequuntur; si go convulsio seque-  
tur delirium, novimus sanguinem non hie-  
re dantem in extremitatibus: arteriosis: v  
venosis lymphaticorum, sed jam in ultimis:  
corticalis: substantia, proxime jam ad substantiam  
medullarem cerebri, vasculis: pro sanguis nalis  
namque penetrat; medulla go irritatur, et resolu-

83.  
Sic nulla ferenda, q̃o mori sepi debet.

Sic etiam  $\square$ nam crassam, ṽsa exiguam.  
convulsionis, delirii signum; quia 6<sup>o</sup> c<sup>o</sup> d<sup>o</sup> h̃i  
 $\square$ ne retenta cerebrum irritant, ledunt; ori-  
tur ṽsa  $\square$ nas ex sp̃smo renum. Li paroxys-  
mos hystericos, Hypochondriacos, ṽsa  $\square$ na  
præcedit, ex sp̃smo.

In convulsione duo ferenda pro<sup>o</sup> annum  
major in nervo influxus. 2<sup>do</sup> soliorum sp̃s-  
mus, rigiditas, contractio præternaturalis.

Convulsionis q̃o oriuntur p̃a in vulnere, lēdine,  
nervo semidistip̃o, puncto, acibus vulñi inf̃p̃s.  
2<sup>do</sup> evacuationibus nimis, ætherothia q̃o  
ex inanitione. 3<sup>do</sup>. doloribus nimis, ventis.  
4<sup>to</sup> labora morum viarum. 5<sup>to</sup> in  
febre, ex irritat̃e, ob acrimoniam, & medulla  
cerebri & systemati nervoso-membranosi. ex  
reprim̃o semper est, si convulsionis vitio cere-  
bri affecti, irritati idioopathice oriuntur.  
melius, si vitio aliarum partium.





Ad 8. March. de, quae plurima acidum absor-  
bent, hinc in infantibus plurimum profunt.

Ante eruptionem exanthematicam, in specie in  
infantibus inaequas convulsiones observavit  
Lieberham.

Qui in auctis continuo sudant cum delirio  
continuo, tremore, convulsione, hoc repente  
in soporem incidere vidi, lethalem, intra horam  
aliquot.

Hypochondriaci, & Hysterici per paroxysmos  
cum refrigeratione extremorum convulsionibus  
corripiuntur; profunt in paroxysmo frictions  
calidae extremorum, clismata, cataplasma  
si gelantis pedum apposti de. extra illum  
proxime vici, visera abdominis ab atra bile  
si adest, mundenatur, sanguis stillentibus corri-  
piatur, et genus nervosum sensibile, facile  
irritabile, debile roboretur in specie cort.  
Peruv. in 8. elect. decort. syrupo de. qui  
ferre in omnibus morbis per paroxysmos &  
recidivantibus & auctis semper conducit.



Sudor Febrilis.

Sudor initio & in incremento febris acutae com-  
parens, sine coctione in E na apparente, &  
sine exsthorica, symptomatikus est, & malus.

Laxitatem extremitatum vasorum, circuli  
sanguinis auctum, & vici principii facilem a  
sanguine separaem pro causa agnoscit.

Hoc in omnibus est eadem & cum sanguine  
cohesio, sic in laboriosis, struictis, & amentis  
hominibus bene & cum sanguine coheret ideo  
febre correpti, raro initio sudant, sed cum vici  
cubis pira, arida manent usq; ad vici criticum.

Toto quodq; mea maligna febrilis sudoris  
symptomatikus causa est.

Vici elemento in sanguine quiescit, ne globu-  
li rubri concrepentes, inextinguibiles evadant, proare  
in febre sudorifica, ob sanguinem factum inextin-  
guibilem, frequentes inflammationes, deliria, irre-  
solvibilia, ideo sepe ad vici magna copia  
etiam sumpta, E na sudore facile elabuntur,

Si enim semel concrevit sanguis, non resol-  
vitur amplius. Si sanguis vena eductus, et  
sepida facile seduitur, minimè, si semel jam  
concrevit. idem fit in corpore, si unio feri,  
cum globulis rubris destruitur.

Nam in febris consideranda, ut sudor criticus.  
asymptomatico distingui possit. intus tamen,  
sudor ante curationem, initio & in incremento,  
quo fluente symptoma non minuitur & plane  
augentur, denique sine ephoria, semper malus  
est.

### Curatio.

Sudor Pestilentialis, Anglinis, si periculo,  
ipso nequit, acce enim interfaciens sudore expellitur.

Alias mitigandus est, surgendo è lecto, in  
lecto jacendo, leviter lecto corpore, pulverinaria  
removendo, potus calidos vitando, frigidi sen-  
sus bibendo ac.

sepe in intermittentibus, diebus intercala-  
ribus, & post acutos tollitatos, ex debilitate  
corporis, humorum tenuitate, sudoribus diffundunt  
eque, debilitantur, demerantur, tunc opus est,



88. viris roborantibus, ut vino annoso crualvat.  
Hungar. infus. herb. aromat. c. vino rubro, si  
her. gallant. Sibiricam infus. herb. aromat.  
cum V<sup>o</sup> bis de die ad 2 coctile. sudorem tra.  
dem compressit semper.

### Diarrhoea Febrilis.

Est frequentior excrementorum liquidorum per  
alium egestio. si sit cum torminibus, et  
stria sanguineis, etiam rupto majori vase  
purio sanguine, Dysenteria, si abruptas  
inutata exant, dysenteria, si chylus evac.  
etur, Passio Celiaca, si copiosa sit egestio,  
cum torminibus, sine hi sanguine, ut intra 24  
horas emacientur, melius sit convulsionum  
cholera dicitur, sunt morbi hi diarrhoea  
febris.

Tria in Diarrhoea consideratione notanda.  
1<sup>o</sup> Diversitas mae excrete. 2<sup>o</sup> locus varius  
maam suppositans. 3<sup>io</sup>. Cause, quod fecerint  
ut mae haec in intestina deponatur.

89.  
primò: mœa diarrhœa. mucos, quæ est mœa lentâ,  
spissa, exspicatione in lœmas, Tophos, induraf-  
cens, sola mœratœ in v. itum solvenda.  
Similis mucus naris, fœces, et totum tractum  
intestinorum, ventriculi, œsophagi innungit,  
si hic majori copia accumulatus secretus,  
sepe puritatem simul habeat acrimoniam,  
alvo expeditur, vocaturq; diarrhœa mucosa.  
observatur hæc quidam post aëris vicissitudines  
transpirare suppressâ, vici et anthummo, et  
Catarrhalis vocari potest, sed virus non debilitat  
salutari est. Si sepe in Catarrhis, coryza su-  
bita tanta copia mucus hic accumulatur  
lentus, et aëris simul naris erodens, ut strophia  
insufficiant. Lymphæ. saliva minimè secreta,  
et deglutita, arteriis exhalantibus, ventriculi,  
intestinorum, minimè secretus liquor, succus  
pancreaticus, bilis hepatica, copia accumulata,  
nam dare possunt diarrhœa lymphaticæ.  
nasaliter secretæ hæc cum chylo resorbentur,  
sed id non fit, alvo evanantur sepe cum  
debilitate virium consequente. in Hydrope



90. vero et leucophlegmaria, lymphæ resorbta,  
salubriter alvo evacuantur. Gluten. mucus  
nâli tenacius, quod ex mora muci, ostium  
v. ingesta talibus; id sepe alvo cognoscum e-  
vacuatur, non raro concreta intestina  
obstruat. huc tributa Vitrea Galleni putat.  
sic quidam glutine tali colon obduratum  
sarcinum representavit, clysteribus in acerbis  
exturbabatur. pus, sanies. sepe ab ulcere  
ventriculi, intestinorum, benigno cancroso,  
hepatis, mesenterii, pancreatis, henis abscessu,  
vomicæ, ulcere gluvæ, nââ purulenta ad  
intestina deposita, diarrhoeam causat. in nââ  
mââ purulentam, ex empyemate, pleori,  
hæc, peritonæomonia ad alvum deponit, est  
diarrhoea purulenta, pro conditione puris  
bona v. mala. si enim sanguine coagulato  
composuit emariato, ob ulcera interna, composita  
lethalis est. Sanguis. si striatum, aliis in  
sanis, cum vermibus evacuetur sanguis alve,  
dysenteria dicitur, quæ etiam ex ulceribus  
malignis, cancerosis, in ventriculo, v. intestinis,

nati oriri potest. Sepe tñ abq notabili. p.  
dolore Sanguis ano exit, ut anastomosi  
dilatatis vasis hepaticis & mesentericis & el  
hemorrhoidalibus. hi quidam post diuturnam  
cardialgiam, magnam coxiā sanguinis ano  
exeruit sine colore, ad brevi sequebatur debili-  
tas summa, animi defectio, mors. omnes q  
sanguinis deorsum, & per sum evacuationes, cum  
tensionibus abdominis, cardialgia, febre et  
ethales. oriuntur communiter, obstaculo nato  
in vena porta, unde communis sunt inflama-  
tioni, ulceri, cancro ulcerofo, obstructioni he-  
patis. quare Bagl. qui sanguinem concretum  
albo evacuat, si chylothoracem dextrum  
fuerit durum, & dolorosum, oculi interni mori-  
untur. hi nobilis foemina melancholia,  
exeruit sanguinem prout, intra 3 diebus  
fiverso hepate sano, dilatatis vasis biliosis,  
sanguis in intestina per ductum choleochum  
proveniens, albo evacuetur, sanari possunt.  
ichor gangrenosus, olivus, cadaver olens. sepe  
ex gangrenoso, hepate, pancreate, mesenterio,



92. intestinis ac. talis ichor foetens evacuator le-  
thaliter. Bilis congepta & aeris facta, diarr.  
has. causat, sepe cum febre. Vir 30 annos.  
alias sanus per 14 dies biliosa tali diarrhoea  
cum febre laboravit, et sequita diarrhoea sem.  
per, prorsus habuit, inflabatur enim abdomen.  
Bilis atra. hoc quod bono omine evacuator  
si vero jam putrida sit, lethali oritur diarr.  
haea. quare Hyg. dysenteria ab atra bile  
lethalis.

In Morbis, in specie acutis, atra bilis visera  
abdominis gravans movetur sepe, et alio &  
Etena evacuator, at lethaliter. Duo vii, ascto  
in acuta excrevere in statu Etena nigram  
virescens quasi putram bilem, et brevi atque  
obit.

2do. Visera varia, maxime diarrhoea suppeditantia  
ut: nasus, os, fauces, epistomus, ventriculus, hepex  
pancreas, mesenterium, vesicula fellea, intestina;  
imò ipsa sanguinis aërmotia in intestina  
deposita, diarrhoeam excitat, sudore sepe curabi-  
lem, ex enumeratis partibus max ad intestina

93.  
detrudi, id, alioq. evacuari, hic sanguis rorans.  
fluens, dormiente aegro deglutitur, alio eva-  
cuatur, varoq. metu periclit. aegrum, sepe et  
mediam. mucus narium in coxyga v. in  
tusi in infantibus deglutitur, alio exit. bilis  
per ductum choleochum copiosius in duode-  
num effusa, diarrhoeam biliosam causat, quodq.  
viridem, sanguinolentam, atrabilem. pancreas  
hepar, ventriculus, intestina, suppurata, ulcerata,  
cancerosa, diarrhoeas causant. inflamm. hepatis,  
pancreatis, pleuritidis, peripneumonias, phrenitis,  
sive diarrhoea salubri solvantur. intestina  
multis exhalantibus, et absorbentibus vasigan-  
dent, quae sepe, infere in scorbutis, dum  
acrimonia sanguinis in intestina ruit, maam  
diarrhoea supersedunt. qd. a dysitis postibus  
prospuit humores in intestina detrudi, et alio  
evacu, et pro rae maam, et visum, a quibus.  
maam in intestina detruditur, constitutione  
diarrhoea salubris v. lethalis. a purgente  
forti, totus per sanguis sub perie feri alio  
exire pot. Si in cholera intra 24 horas totum



94. corpus emaciatur, convulsionez sequuntur,  
a subita tali evacuatione.

23<sup>tho</sup>. motus intestinorum peristalticus, & adhaerens,  
& debilis, relaxatus, & tonus, vasa absorbentia con-  
tracta, obstruita, multo obliterata, cicatrice obduc-  
ta, aphthis obstruita &c. dum per exhalantia  
in intestina pullos humores inhibere, absorbere  
requirunt, qui collecti alio extruuntur. si  
multum potus sumitur, qui reabsorbetur. Inna  
sudore, expeditur, s. vero liquor non resorben-  
tur, diarrhoea oritur. si intestina paralytica  
sint, tum assumpta infusis aegro imbuta alio  
exunt, ut p. in lienteria perisima, siq. in  
in acribus focus infusis aegro elaboratur, acrio  
affectu, sine noxa, quod in cum periculo.

motus peristalticus adhaerens diarrhoea causatur,  
ut a sumpto acri purgante. lienteria ab ulcere  
ventriculi, intestinorum, cancro hepatis, pancre-  
atis &c. ob acrimoniam irritantem, ut non  
detur mora ciborum digestionem.

Vasa absorbentia vitata diarrhoea causatur  
ut in lienteria post dysenteriam, dum ultra

ex dysenteria orta cicatrice obductas vasa. 25.  
absorbentia vitiant, obturant. ex eadem causa  
p<sup>oss</sup>et etiam oriri fluxus coeliacus, huius h<sup>abitu</sup>  
signis: ex obstructione glandularum mesenterii  
oriatur, ut p<sup>oss</sup>et in infantibus: cum ventre duro,  
humido hoc laborantibus, chyli enim mesen-  
terium per se non valens, alio evacuat,  
cum sequente macie.

### Prognosis.

Pro ratione macie, et viscerum affectionum, maciem  
suppeditantium diarrhoea bona & mala, curabi-  
lis & incurabilis. Li.

Sæpe diarrhoea biliosa, atrabiliosa, catarrhe-  
tica, mucosa, purulenta bona. inflammatio hepatis,  
pancreatis, intestinorum, pleurae, pulmonum,  
cerebri, dum macia obstersit, quidem resolvitur,  
at jam doctus agnoscit, ut sanguini assimilari  
nequeat, diarrhoea solvitur saluberrime.

P<sup>oss</sup>et bonum, ex empyemate, abscessu hepatis,  
pancreatis, mesenterii, intestinorum ventri-  
culi alio evacuat non raro salutiter.



96. Cienteria post Symplicisiam, ob ciatruis, &  
paralysem intestinorum vix curatur.

Diarrhea ex atra bile corrupta, ulcere  
& cancro, intestinorum, ventriculi, hepatis,  
mesenterii, pancreatis, pure existente jam  
corrupto lethalis. Bagl. vidit virum con-  
tinua diarrhoea laborantem, cum facore oris  
cadaveroso, ex ulcere cancroso Coli.

In Jani ex transpiratione suppressa orta,  
hac adveniente, cepit, quae Hyg. alii laxitas,  
alii densitas, alii raritas, alii obstructio.  
sic Diarrhoea ex sanguine seroso, aci, sere,  
ad intestina mense, in Scorbuticis, serosi,  
phlegmaticis, dum intestina tali sero, sere  
acri, relaxantur postea irritantur, sudore  
repleto ex diascordae curatur ordine.

Diarrhoea colligativa ex ulcere & vomit-  
u, pulmonum, hepatis, ventriculi, pancreatis,  
mesenterii, intestinorum, lienis, lethalis.

Diarrhoea sponte auctens in Hydroge,  
ex va putredine orta, lethalis, Venim talis

97.  
putrescere, resorbta sanguinem coagulat, putre-  
facit.

Diarrhoea initio in acutis, ma<sup>2</sup> necesse coctas,  
v<sup>2</sup> in incremento p<sup>2</sup> coctione in Diu, allevi-  
atione symptomatum mala.

Coagulative in acutis cum febre, & debi-  
litate virium lethalis.

mala item presentibus exanthematibus;  
ob retrocessionis metum.

Julpius recenset, foeminam postfebrem per-  
traxim, obstructione huius laborantem, per  
14 menses, excrevisse quotidie multum flavescenti-  
bus ad ipsi<sup>2</sup> stercori incumbentibus, sine torminibus,  
febris coagulative, aut emaciatione. adeps  
erat, flamam enim in igne coquebat.

Diarrhoea sine dejectione virium, ubi no-  
xia educuntur, bona, mala si ultimus p<sup>2</sup>gat.  
ob continuum intestinum stimulum enim,  
ex sanguine ad intestina affluente, ubi educuntur.  
huc. Diarrhoea diuturna, ita relaxat intestina  
ut continuus humorum in ea affluxus fiat,



98. Siq. sanguis sit acrimonia scorbutica, Ena,  
infatus, mit ab intestina, capillus irritat,  
simil consumitur purgatio, ideo emaciantur,  
Transpirat, Ena imminuitur, cum multum  
liquidi ano educatur. et diffinitione bonus  
debitus intestinis reddi potest. Si in pueris  
vires a malo victu diarrhoea per annos  
durantes oriantur, a sola debilitate intest.  
linorum, licet viscera sanasint, multisque  
roborentibus cedunt.

Intestina vinturna diarrhoea exoriantur,  
mucus enim obliniens internam superficiem  
abraditur, Acrimonia nudos papillos, nerve  
as tangit. Sepe intestina inflantur, ulce  
rantur, ut abrasamenta ex lunicis intest.  
linorum alvo exeant cum dolore atroci.  
Corpus privatur nutrimento unde maries,  
quae grvida, si bi dure diarrhoea abortit  
quia nutrimentum demitur foetus.

Purgatio consumitur, et sanguis resolvitur,  
alvoque sub specie feri educitur unde ab inani  
hi vapores atrophia, simul et crassus et huius  
proliatus.

Vomitibus ergo, & diarrhoea, & vitio ventriculi;  
 intestinorum, ulcerorum, canerosorum &c. &  
 vitio mae contentae, acida biliosa &c. & vitio  
 aliorum viscerum oriuntur. Si hepar, pae-  
 & creas, alia bile largiens, vomitosum, ulerosum,  
 canerosum, vomitum & diarrhoeam causat,  
 pae seque vomitus, strabiliarii, purulenti  
 observantur. reliqua enim viscera etiam  
 depita mae in intestina & ventriculum  
 seque detrahunt, bono & malo eventu.

### Curatio.

Si per acrimoniam corrigentia, sedulenta  
 quata, roborantia. Si si ventrem in cholera  
 guscula tenuia carnis vitulina, gallina pro acri-  
 deducendo debet, eaq; per clismata injecit, datis  
 simul opiat.

Si bilis viscido-acris & roridum ocosum caa,  
 & & pagonaeva, ut cum melle, roborantur, nite-  
 orum.

Si acidum, focusq; virides excremantur, acidum  
 purantes. absorbentia conspuunt, ut & figill.  
 bolus coena, C.C. ustrum.



Si bilis putrida albulina flava & atra  
nāc alkalina, acida conducunt.

Māa evacuetur vomitu, quia conuulsione  
māa impedita intestinis exantibus, ventri-  
culos exprogetur, notus, persistalticus inver-  
titur; Si Jibenhām in antio initio, si  
nausea vomitus initio rogebat, licet nil ejiceret  
tur vomitu, felicitate dedit vomitorinum et  
mirabatur, vix egestam māam operapreci-  
fore, symptota tū remississe. Dysenteria  
toties repetito vomitu, licet nulla indicatio  
adfit, curatur; iucumant. Specifica est,  
in Diarthea, et Dysenteria.

Si in Diarthea, simul et in Dysenteria, ab-  
domen sit inflatum, humidum, cave a systen-  
bus, ad rhabarbarinis māa evacuetur, idem  
fiat, si symptota Diarthea & Dysenteria, tormi-  
na rogeant, signum enim est māa in intesti-  
nis relicta. idq; continetur donec tota  
māa evacuatā sit, abdomen ubiq; mode  
fiat.

Huc opriata, ut land. liq. Sient. landan.  
 ydon. Ithenac. coless. clut. diaphor. o'omij.  
 dulc. clismata o'ofa, item clisma ex dulc.  
 torment. o. diaphor. quo diarrhoea in pleu-  
 ritide, multis alijs cedens, in foemina illi-  
 co sopita est, ac reserantur in specie in diarr-  
 hoea torminosa, dysenteria, et hypercatasi  
 a purgantibus drastis.

Ma per sudorem revellatur. Si in ambis  
 sudore compressus diarrhoea, in specie dato  
 diaphor. dysenteria maligna sudore curatur;  
 diuturnam diarrhoeam, ubi jam laxitas  
 intestinorum adept, sanguis totus in ea ruit,  
 et pro aer, ut in scorbutis, scrofi, phlegma-  
 tis ac. sudor repetitus sistit. optimum tu-  
 est sudoriferis opriata, roborantia ut cort. cas-  
 carid. ac misere.

Saepe et diarrhoea a massa sanguinis acri-  
 monia orta, quae tota in irritata, et laxata  
 intestina ruit, ut in scorbutis, chypochondria-  
 cis, non curatur, nisi sanguis degreuetur.



In diarrhoea colliquativa phthisica dysina  
ex diaphora. 3<sup>o</sup> injectum mollem retordat  
perhoras, suspendo diarrhoeam.

In diarrhoeis aliisq; aliis fluxibus sudor  
est saepe suppressus, quia omnia liquida ab eo  
evacuantur, dum sudor, & una adveniens,  
bona.

Coxitis intestinorum roboratur, si inde  
diarrhoea ortalest, & expulso aceri remaneat,  
convenit vitrus. ferri, potus. gravior, ut &  
expulsi. ferri, & cost. casu. torment. extr.  
torment. nux. mosch. cost. granator. rad. bistort.  
cost. peruv. ac hoc in decort. B. B. B. vino  
per dysm. injiciatur, huc rhum. tostum,  
H. Ch. tosta prestat. ext. epithem. aromat.  
cum vino, usque ex Theriac. Androm. c. o. o  
H. Ch. expulsi. camph. ac conduntur.

At prout debet nostra noxia expulsa esse,  
quandiu enim nostra foetida, nigra, livida, cru-  
guosa, viridis, purulenta, ichorosa, biliosa  
glava fluit, abstinendum ab his, usque dum  
nostra ad foveas naturales accedat.

102.

Optima sunt talia adstringentia in hien-  
teria à nimia laxitate Toni intestinalis;  
cum aromaticis maritata.

Diarrhea, sunt dysenteria & vomitus;  
per peroxissimos redivans. & antea, in  
peroxismo quatis. ac. extra illum cor-  
poris. Peruviano p. r. c. ovis misto cedit, p. r. i.  
dysenteria & Diarrhea cum febre, &  
febr, & inflammationi, futures gangrenae  
reperit.

Haec omnia dicta intelliguntur, De diarr-  
hea, & dysenteria, in corpore sano, visceribus  
bonis, nulla laeae affectis. Si enim diarr-  
hea & dysenteria ex ulcere, cancro, ventriculi;  
intestinorum, abscessu, ulcere, cancro, hepatis;  
mesenterii, pancreatis, & ovario, sola  
diluents, acrimonie opposita, prosunt.  
vomitoria, purgantia, adstringentia dum  
nocerent.

In diarrhea, similiter dysenteria. cum  
febre, vendicatio, ad praevendam inflammationem, prodest.



## Exanthemata Febrilia

Sunt efflorescentiæ, in vasis cutaneis hærentes; adeoque habent pro mæa aliquid, quod extrema vascula cutanea pertranspire nequit. mæa febrilis, ad proportionem ultimorum vasculorum cutis, subtilisata, sudore diffatur. si hæc colla crassior sit, hæret in ultimis finibus vasulorum; suntq; exanthemata mæa acris criticæ & symptomaticæ a frigore in cutem secreta. unde pro varietate exanthematum febris varia sortuuntur nomina. ut Febris erysipelatosa, urticata, scarlatina, miliaris, petechialis, variolosa, morbiliosa ac.

Varicellæ sunt primo maculæ rubræ in partibus pulcherrimis, 3. & 4. die in facie, collo, & in aliis partibus erumpentes, aliquantum elevata epidermide lumentes, quæ inflammantur, et apparente in medio puncto albo suppurantur, surgentq; pure flavo, crassiusculo,

plena. Si distincta quavis variola separata  
conspiciatur, discreta vocatur. Si tam dense  
erumpant, ut multa in unam confluant,  
cum humore facies horrida & manuum, &  
cognia mae incabilis, confluentes. Si lata  
sint, et pallida, verucinae. Si & spiritus acri  
plena, non pure, aquosa. Si aere inflata,  
phlogomatica. sanguinem fundentes, &  
livida, nigra, & cum limbo nigro, pessima  
sunt, quia maligna, gangrenosa, cum febre  
maligna colligativa conjuncta, quare potius  
si deest. aven. c. an. Et.

Post eruptionem horum cessat febris, quae  
denno sub suppuratione ob dolorem, & tensionem  
cutis accenditur, febrisque secundaria suppu-  
ratoria vocatur. Huius post eruptionem fe-  
bris non cessat, malum, magnam enim  
cogniam mae variolosa in sanguine produ-  
centis indicat.

Dierthea in discretis periculosa esse solet,  
in confluentibus vixi cum salubrem, neque  
eruptionem impedit. vide Libentiam.



106. Morbilli sunt maculae majores, minores,  
vires, figurae, pulchrum morbum similes, rub.  
re, si malignae sunt, plumbeae, nigrae, pra  
eunte numero, et mole coalescunt, et aliq  
tum entem excedunt, qd tactu notatur optimi  
non suppurantes, ut variolae, sed cuticula rugin  
tae spumatione sine dolore, ardore, sed tan  
tum declinante morbo cum pruritu deci  
dentes. aliqando aliquis tumor faciei, colli  
conjugitur. Bonum est, si hii excreti, astra  
asped. ma epe videtur. Una, subtilis, vasa  
la minima obstruens, cuticulam comburens,  
a vasis separans. a sero qd aeri oriri viden  
tur, quare saepe 14 diebus ante lapsis, sicca  
serina molestat.

Subeche, cum variolis, v. ante, post eas.  
se soli ingruunt, sunt exanthemata  
rubra, nec elevata, nec suppurantia, nec lata,  
sed sublonga quasi, striata, cum febre, et  
inspicula erumpentia, et spumatione cum  
dolore proveniente evanescentia, a sero aeri  
orta.

*Charlatinum exanthema*, sunt maculae <sup>10%</sup>  
rubrae, parvae, sine nimia elevatione cuticulæ,  
angustissime penes se erumpentes; decem in  
unam maculam latam, ut imperialem agnoscunt  
coeuntes, squamatum, cuticula adusta, decem  
dentes. Sæpe humorem universi corporis faci-  
unt.

*Urticatum exanthema*, sunt tubercula  
rubra, in scalptione ob pruritum, alba, dura,  
quasi notius cutis caesa quicquid, sæpe cum  
humore corporis.

*Exanthema miliare album*, sunt exanthe-  
mata instar milli parva, alba, sero acri pellu-  
cunda plena. cum pruritu et squamis dispa-  
rentia. si nigrescant maligna sunt, à sero  
acri vascula lymphatica rupta orta.  
miliare rubrum cum pruritu instar mili-  
prodit, et cum pruritu squamatum decidit,  
à salinis acri sanguine oritur.

*Petachia* sunt maculae rubrae, purpureae  
cinereae, fuscae, nigrae pessime, instar morfus.  
pulvum, à quibus desinguntur, sunt compresse,



108. non relinquunt punctum in medio m.  
2. bicusidum, ut signum morbos, pulvis. item  
oxymelle facta non evanescent.

Exanthemata haec & cum febre benigna,  
& non & maligna comparantur.

Si qd febris cum subitanea virium, sine  
causa manifesta, prostratione, erythemia,  
confusio spirituum, comis. dolore, facie imm.  
& tarta, sapore putrido in hoc, maligna est,  
contagiosa, putrida. Similis enim debilitas  
in febribus benignis in statu primo compa-  
& rer.

Sub aestu exedente nunquam erumpunt  
exanthemata, praetelabentur enim humores  
vascula lateralia seermentia, quod aestus  
vexator debet acidi, pro ratione, plane in  
febre coequativa, putrida, in H.

Athor in aestu temperato & sufficiente  
optimum excellens est camph. cum modico  
nitro combinata, cum cornes. f. C. M. item  
Cucub. sicca variis corporis partibus appo-  
sta, quae quasi extrahunt exanthemata recepta.

109.

Veneratium multum devoratum, sequitur  
anxietas, exanthemata, quae vomitorio  
dato omnia cessant. restia herba cuti  
applicata, exanthema producit.

### Febris continua Putrida.

Si febris sine gravibus symptomatibus, durat per  
24 horas Ephemera. Si diutius, sine tñ multis,  
et gravibus symptomatibus, Synocha simplex.  
Si huius diutius pergat, cum Olia, et coo sangui-  
ni volatiliscentur, humores, blandi degenerant,  
vertitur in synocham putrem. huius initio  
statim praesens acrimonia in sanguine, fit  
febris cum gravibus symptomatibus, vocatur  
Synocha putris.

In ephemeris, et synocha simplicibus vix ulla  
adeo acrimonia, sed tantum boni humores,  
sola aucta circulatio molesti esse videntur,  
quare venesectio, diluentibus, temperantibus,  
clismatibus facile debet, sine sensibili crisi;



110 nisi longiori aucto acule humores degene-  
rant, tum sudore solvitur, Et na sedimentosa.

Si male tractetur, etiam o<sup>o</sup> sanguinis  
exaltentur, in putrem degenerat synocham.  
non intelligitur tñ per putredinem, vera  
corruptela sanguinis cadaverosa, sed tan-  
tum humorum degeneratio in acrimoni-  
am, dum o<sup>o</sup> et etia sanguinis volatilibus  
tur, vasa stimulant. Et hinc sepe sudor  
olivaceus, foetida alvi excrementa, Et na  
foetida testantur corruptelam, tñ hoc potius  
putredo incipiens est, quia citius vasa cerebri  
destruerentur lethaliter, anteqm vera putre-  
do in sanguine oriretur: quare febres pū-  
tida diuuntur, dum a naturali blando statu  
humores, in acrimoniam degenerant, et in  
putredinem vergunt.

Synocha igitur simplex, supstitudinem sangui-  
nis inflammatoriam, quae heret in vasculosa  
viscerum compage, et vasis capillaribus extre-





112. non raro extrema frigent licet urantur  
interna, sanguis enim siccus. tantum in  
majoribus vasculis circulatur, in extremis non,  
cor enim debile ad extrema usque nequit pro-  
pellere sanguinem, obstaculumque vincere  
unde lethale est. plurimam autem id fit  
in inflammationibus partium nervosarum,  
ut ventriculi, intestinorum, dum membrano-  
sam partem siccus ad extrema usque  
penetrans, circulum impedit.

Pulsus celeritas major est, quoniam in aliis febribus  
saepe inaequalitas, dum ob sanguinem siccum  
difficultas circulantem, dum acrimoniam.

Subinde in inaequali pulsus oritur, ex febris  
et circa praecordia haerente, vomitorio exarsa,  
deponens. imo pulsum varie turbatum circa  
crises observari, haec indicare solent. testatur  
ipse multoies verissimum experiri sum.

Quia crassa, rubra, turbida, cruda, sine  
sedimento; nalis est coloris straminei, in

ephemera, & synocha paulo coloratio; quae  
jam rubrior est, eo majorem humorum de-  
generationem indicat.

In Temperamentis Sanguineo-plethoricis  
plurimum observatur haec febris.

Sicque febris ab initio ad finem usque aequalis,  
homotonos seu acmaestica, si paulatim increpat,  
epacmaestica seu anabatica, si descrecat,  
paracmaestica vocari solet.

Cum eger in aspectu medico trobetur, quae  
pulsus non est statim explorandus, sed post  
paullulum temporis, in utraque manu cum  
sepe arteria in uno corpore profundius jaceat,  
hic pulsus parvus videtur.

### Prognosis.

Pulsus fortis, magnus in putridis bonus.  
Debilis, frequens, parvus, inequalis, inordinatus,  
intermittens malus. in moribundis pulsus  
debilis, celerissimus uno alterove validiori ictu  
intercurrente, cum pectoris anxietate observatur,



Cum cor collato, in finibus venosis, et auri-  
 culis, sanguine, validius se contrahit, dein  
 intermittit, unde celerime minimèq; in  
 arteria undulationes percipiuntur, arteria  
 enim aut debilis, aut spasmo stricta, osilla  
 se vivide nequeunt; donec iterum repletum  
 cor validiorem iterum faciat; quare in  
 morbis pulmonum, si pulsus in magnitudine  
 decessat, et anxietas angustatur; lethale.  
 brevi ante mortem, pulsus in corpore non  
 percipitur amplius, extrema frigescant, cum  
 sudore frigido. indicant qd haec vitam va-  
 cillare.

Saepe concocta materia, ante crisin variequirit  
 in pulsu mutationes. vid. Solanum.

Respiratio quo difficilius frequentior an-  
 helosior, cum narium junctis diductis, dolor  
 circa vitula, quo inordinatior, pejus, quia  
 oppletum, sanguine crasso, pulmonem indi-  
 cat, quare junctis narium diducuntur, pectus

valide attolitur, ut majori copia aëre capto, iis.  
pulmo repletus dilatare valeat. Deo respiratio  
inordinata, modo rara, modo celer, item valida  
inspiratio, et parva expiratio, et parva inspiratio,  
et valida expiratio, item expiratio feruida et  
plene frigida lethalis, jam enim gangrena  
adept. in gravidis, gibbosis respiratio est  
naturaliter difficilis, quod in febre plus angustatur.  
Inprimis quod longius, in prope morbo, in  
vasis pulmonum stagnare incipit, minori  
copiam in cordis ventriculum sinistram redit,  
et artenas, quod pulsus in celeritudine magni-  
tudine detrescere debet, lethale est.

Eapitudo maxima, iactatio, situs mutatio,  
decumbitur in dorsum extensis membris, lethali-  
tia, obsumam omni debilitatem bonum  
defectum, membra movere nequeunt, jacent  
quod in dorso immobiles, sic cadaver, si in latere  
prostratus, propria gravitate in dorsum nititur.  
Si egi nullius rei sint solliciti, ut produm,  
nil interrogant, sensorium enim affectum est!



Si nulla appetant alimenta, & ea idcirco  
 evomant, & sumpta, gravitos, anxietas, seque-  
 -tus, cepit enim digestio, q̃ lethale. Item  
 si magnam inappetentiam, subitis appetitus  
 excipiat, sine facta crisi, sensorium enim  
 affatum est.

Quia, quo rubicundior, majorem attitum  
 denotat & regenerationem humorum in  
 putridum aliali. & si sit turbida, et nil  
 subsideat, fors, quia ob attitum portio-  
 -ne volatilisata, gravitatem specificam ami-  
 -serunt. quo jam citius sedimentum subsi-  
 -det, melius, ad continere sedimentum debet  
 & cum erythoria. Si in malignis Septimi  
 in aegris delirantibus cum sudore, tremore ma-  
 -num, & pronebat, aliquoties sedimentum  
 movi. In sequebatur. Quia in aestu ipsa  
 delirium, convulsiones praebuit, & hinc  
 enim noxia in corpore, q̃ spasmodum rerum  
 q̃ cerebrum afficiunt. Si in suis aegris  
 clabatur, cerebrum patitur, unde plurimum

is observatur in delirantibus, comatosi. 117.  
□ na parca, stranguiosa, mala.

Si tremuli motus musculorum ad finem  
manus tremulae, si pulsus tangatur, ager  
manum retrahat tremulam, inscius, tendo  
subpultus, convulsiones instant; tanta enim  
sensibilitas, irritatio nervorum esse videtur,  
ut levis tactus statim ideam communiui ce-  
rebro, unde inscius manum retrahunt.

Pessimum est, si oculorum splendores pe-  
reat, jam enim humorum subtilissimorum  
in oculis aristas cepit, cum non nictitant  
moribundi, a pulvere in aere volitante de-  
torquentur, sicuti flenti.

Si vultus agri cum lacrimis moerorem  
exhibeat, ceteri tamen reges se insensum esse, pessi-  
mum est. Lacrima ex audita morte  
non adeo mala. imo lacrima saepe ante  
criticam haemorrhagiam, ob majorem son-  
gvinis ac caput appulsum, fluunt.



Si difficile dormiant, seque evigilent  
cum terrore, & dormiant quidem, at evigilantes  
nullam refactionem, potius majorem debili-  
tatem sentiant, respirant, ex turbulento  
enim somno, convulsionum metus, ex non  
refectio, compressio cerebri, nullus animi  
secretio judicatur.

Pustule, purpuree, livide, nigrae, gan-  
groenam humorum dicunt, & malignam  
sanguinis resolutionem. Si & cantharidum  
in jugularem canis viventi injecta, sangui-  
nem venitus dissolvit, nigrumq; efficit vis-  
bile.

In scorbuticis in febre exiguâ, seque appa-  
rent purpuree & livide maculae sine multi-  
tudo gravibus symptomatibus.

Chylothorax, tensus, inflatus, abdo-  
men, ventriculus inflatus. lethale videtur  
esse paralyticè bonis remediis non resistens.  
nec aëre.

Cum in febre humores & in suppuracionem in-  
 flammatoriam & tenuitatem, & resolutionem ma-  
 lignam, ubi Peste, alijsq; malignis, ut febre  
 variolosa, Petechiis, vergant. prout in priori  
 morbo, cum quiescit, sit magnus, plenus, fortis,  
 frequens, venesectione, etiam repetita, initio  
 si neceps, vomitorio, diluentibus, temperantibus.  
 Opus quoque in resolutione usq; febre maligna,  
 miasma putoris sudore expellatur, non ne-  
 cessario acidis, quae & miasma putridum alca-  
 linum corrigunt, captaunt, & sanguinem coa-  
 gulant; venesectio in talibus febribus nocet,  
 non ita vomitorium, cum in his sanguis non  
 peccet quantitate, at qualitate maligna.

Indicant hic malignae statim initio cum summa  
 virium prostratione. Habent hic putride, & reso-  
 lutoriae febres remissionem calorem, qm febris  
 est sanguinis inflammatoria suppuracione orta.  
 prout Siwenham an Op. p. 101 dilucido usus est.



Febris ardens?

Febris continua v. sunt continentes, si ab initio ad finem usq; in eodem fere tenore calor permanet & continue remittentes, si quidam remittant, non tñ totaliter intermittant.

Ardens jam ab urendo, seu calore urente et siti inextingibili nomen habet. cum autem exacerbationes, & remissiones habeat, ad continuas remittentes, quotidianas, tertianas, quar-  
tanas reducitur, in quibus cost. Peruviano opus est. quidam quotidiana laborans, pleuritica corrigitur, & febris quotidiana prope tenore suo, sed in intermedio tempore vero urgebat febris inflammatoria pleuritica. quoniam hic, an in tali casu cost. Peru. pleuritidis nocere? an fors, febrem inflammatoriam temperando, prodesse?

Diagnosi.

Calor ad luctum fere urens, circa viscera vitalia sumus, estus, in extremis calor remissior, quod si sanguis inflammatorie fissus, sanguis enim n. circulator in extremis, tum ob sui crassitiam,

tum vasorum stricturam, quare per aliquam  
 vasa majora celerior est circulatio, attritusque, ut  
 in vasis pulmonum, ideo aer inspiratus styge  
 calidissimus, siccitas cutis, narum, oris, lingue  
 limbo eam dissipatum, tum vasa exhalantia  
 constricta, quare Hyg. febre ardente precurrentes,  
 siccitate obeunt.

Respiratio sensa, anhelosa, citas, obcelerem  
 circulum, attritum, et inieabilitatem sanguinis  
 per pulmonem.

Lingua siccis, flava, nigra, exusta, aspera,  
 quia vasa exhalantia exsiccatas ab inieabili san-  
 guine infarcta, circulatione protruduntur, em-  
 inuntur, et una cum quodam livido in eis  
 rarente, exsiccatas, sordes lingua constitunt  
 flavescentes, nigrescentes dein, et siccis, exustis,  
 vidi sepe crustas ex lingua nigrescere. sepe  
 per similes quod in esophago, ventriculo,  
 intestinis exsiccatione contingere solet. L.  
 lingua humectari incipit, in vitæ cruste, ut  
 in gangrenas separantur, a vivis, bonum est.



Sibi ab incabititate humorum, siccitate, acrimonia & in sanguine & urinis, vis, alcalina, aromatica, spiritusosa, acida, Ofa oritur. in ardente à siccitate exhalantium, constanti, oneg, in cabititate humorum, et acrimonia alcalina dependet. Si vero deficient, tunc causa sibi adsit, non sibi, quare in lentibus potius seque praebetur.

Alii fastidium, nausea, vomitus, halitus, oris, foetio, sepe alii fluxus, obspimus, à bile exaltata, corrupta. egi carnes, ova omnia, alicalescentia fastidit, et acida appetunt, non vero omnia fastidit, male omne, ob creberrimum quodam affectum.

Anxietas, inquietudo, tum à difficili transi-  
tu sanguinis per pulmones, et veram portam, tum sordibus in ventriculo, intestinis, putridis.

Summa lassitudo, tum à rapidissimo humo-  
rum motu, tum acrimonia infuso sanguine, hinc spirituum secretionem vitia, inde affe-  
ctus. sepe obuium dolor costarum, carnis con-

Infirius ob acrimoniam dum vasa, membranae,  
pericardium irritantem, tum circulum humorum  
irritantem.

Infirius, ab incalibili sanguine, vesiculas  
pulmonales prementem, unde una alteram pre-  
mit, atterit. Ico in peripneum. pleuritice  
Infirius ex hac causa.

Vox glaucofa, à nimia affe. asthenie siccitate,  
laringis, unde per lethali, & inflama-  
tione. Ico in dysenteria, diarrhoea gutturali,  
acuti, arginae, cum anxia potus deglutitione,  
lethali est.

Delirium phrenitis, pericardium, comae, comae  
vulso. diebus, in quibus exacerbationes.

### Prognosis.

Febri hac habet suas exacerbationes, quare bene  
quotidiana, tertiana, quartana biliosa continua  
remittens appellari potest.

Si tertiana & secunda exacerbatio sit cum animi  
delirio, sudore frigido, pulsu inaequali, obscuro &  
cavi, evadat agri, communiter sequens exacerbatio  
ob vires fractas lethali est.



In exquisita ardente, cum pessimis  
symptomatibus, raro aeger 4<sup>to</sup> die supervivit.

Solitus hemorrhagia nasium, mensuram  
hemorrhoidum fluxu, ab largo, nam stilla,  
die mala sunt. hic quidam in hac febre,  
hemorrhagia nasium, per dies 3, continuante  
a Belio liberatus est. aliquos gutta 3, 4  
die stillantes, mortem proterendum, dum enim  
adeo quidem impetus, ut arteria solvatur,  
ut sanguis corpus sibi ipsi viam obstruat,  
nisi post sequeatur hemorrhagia larga.

Hemorrhagia nasium critica non raro,  
gravitate temporum, tenebrosa caligine,  
precordiorum quodam tensione, dolore, pruritu  
nasium, et tensione oculorum, faciei rubore,  
naris dextrae sinistrae rubedine, indicatur.  
sic Gall. sto die morbi, aegro, credenti se vide-  
re sequentem rubram, hemorrhagiam nari-  
um praedixit, nil tentare voluit, ut aut Belio  
eraret. ideo Hipp. Tensio Chylothodiorum

Sine inflammacoe, hemorrhagia signum. Galien.  
aeque, si dumer chyrochondrium sinistrum cum  
pulsatione, ex nare sinistra sanguis fluat. si  
dextrum, ex dextra, quod in nimis hemor-  
ragia naris sinistra chyrochondrio sinistro,  
naris dextra chyrochondrio dextro, utriusque  
naris ambobus chyrochondriis applicuit -  
cucurbitos cum effectu. ne autem in solu-  
tari narium hemorrhagia, nimis despective  
cucurbitis sanguis ad chyrochondria deri-  
vetur, cave. si eundem cucurbita ad chyro-  
chondrium sinistrum apposita, in nari he-  
morrhagia sinistra, inflammationem tamen  
auespuit.

videtur esse inexplicabilis quidam capitis  
cum chyrochondriis consensus.

Omnia haec hemorrhagiam noxiam antea-  
cedentia signa, oriuntur ex majori sanguinis  
ad caput appulsu, quare non raro pulsus  
bis feriens observatur vid. Solanum.



126. ut autem bona & integra contingat  
crisis, in  $\square$  sedimentum esse debet. Licet  
quidam die critico sudavit cum erythoria,  
& cephalone symptomatum, ad quia  $\square$   
erat tenuis, redivivam passus est, sudavit  
iterum cum erythoria, &  $\square$  tenui, sed re-  
divis morbus tam diu, donec in  $\square$  na  
sedimentum poneretur. nam enim mitem  
craspiorem  $\square$  na evacuantem, successibus  
quasi paroxysmis, ad sudoris subtilitatem  
coquere debuit, cum sanis humoribus am-  
plius assimilari non potuerit. fors ex  
hypothesis rerum reventa generaliter craspior.

Die criticus est illud tempus, quo materia  
morbi cocta, subacta, ad proportionem va-  
riarum excretionum subtilizata, variis  
viis e corpore educitur; sunt quoque dies, 4. 7.  
11. 14. 17. 21 &c. quia tantum temporis  
natura in preparatione, & coctione materia morbi  
requirit; licet si simul cum  $\square$  evacuari debet,

127.

lial enim sudor multus prodeat cum le-  
mine, si  $\square$  sit tenuis, non sedimentosa,  
reidua fiet. quod:

si die 4to exarcentur omnia cum  $\square$ is  
condis, 4 die mors instat, si 4mo exarben-  
tur, tum q<sup>u</sup>o in motu indicatur, tunc p<sup>ro</sup>mo.

Sape in die 4to fit exacerbatio, 4mo  
adhuc major, & in 14 p<sup>ri</sup>mo obit.

Quandoq<sup>ue</sup> fit exacerbatio die 4to cum  $\square$ is  
condis, & ob vires fractas, p<sup>ro</sup>mo die 6to obit.

Solvitur sudor universalis calido, copioso,  
Vomitum, alvus, die critico, cum  $\square$ no sedi-  
mento. Sape sputo crasso, p<sup>ro</sup>mo morbo  
inevitably sanguine infarctus erat pulmo, qui  
mutatur, solutus, die critico tussu ejicitur.

$\square$  nas nigrae, cum tali sedimento, le-  
thalis, & ob sanguinem gangliofum factum,  
& atram bilem morbo, motum, plane si  
foetida sit, sive crassa, sive tenuis.



Sanguinis fontem & sanguinis multus,  
 lethalis; ob vasa in renibus & pulmone  
 incabili sanguine rupta, & vasa acibus  
 sanguinis erosa.

In malignis talis multus sanguinis,  
 & fontem, aequale lethale, ob sanguinem  
 resolutum tenuem factum. id in vori-  
 cosis malignis observatur non raro, & an-  
 tist. & diutius conducit.

De gluti lesa mala. antia sititate  
 nimia aut inflammatione pendet, cumque  
 nil deglutiri possit, humido hi opus sit,  
 patet. pressimum est. sepe deglutitionem  
 difficilem in acribus, brevi ante crisis, ob-  
 servari lethalem.

Astus internus cum extremis frigidis,  
 fere lethalis, proia aut crassus sanguis  
 extrema circumloce cepit, & tantum per  
 vasa majora interna movetur, aut interna  
 jam adest in visceribus, in fere membra.

nos, parotibus, inflam<sup>2</sup>o. 3<sup>o</sup> lethalis. 129.

Facies rubra cum sudore frigido, glutinoso, mala, sanguis enim vasa aliina ingressus est, & denne exprimitur sub specie sudoris visidi, cili adherentis, sudor enim criticus, calidus, universalis, avolans brevi esse debet.

Parotides non suppurantes, & diffidentes cum augmento febris, mala, nisi alius vis eliminetur, mala cum euphonia, & parotides redeant.

Parotides symptomatice, urantur, feru<sup>2</sup> condente, & ita ad suppuratam brevi deducantur, ne mala maligna retrocedat. v<sup>o</sup> Pagl.

Alvus nimis fluxa, obliuione, foetida ante coctionem, sine euphonia, lethalis, praedixim enim indicat.

Si tremor artuum, delirium, & delirio tremor accedat, lethale, medulla cerebri, & partes membranosae irritantur.



120. Peripneumonia, pleuritis, ventriculi,  
intestini, hepatis, lienis, mesenterii,  
diaphragmatis inflammatio. lethale.

Solvitur sic critico rigore, horrore,  
dum inflammatorium spiritum in extremis  
vasculis hucens subito solvitur, in vacuas  
quasi venas ducitur, rigorem autem cri-  
ticum sequi debet sudor universalis, cum  
etna se dimentosa, hemorrhagia narum  
&c. si hec non sequantur, malum est, ori-  
tur tunc rigor à minimis vasculis in ex-  
tremis totaliter obstructis, corde debili, non  
potente sanguinem ad extrema usque ob-  
staculum in extremis, propellere. unde  
lethale.

Ardens differt à syncho, quia habet exa-  
cerbationes, et remissiones. ab intermittenti-  
bus, quia remittit quidem, non tamen  
intermittit. à continuis remittentibus.  
levioribus, interquartiana, tertiana, quartana

continua remittente, quia est cum summo  
aestu, imprimis circa vitalia, siti inesci-  
pibili, et ariditate totius corporis.

In hac febre est in extremitatibus va-  
sorum, sanguinis stasis inflammatoria, quod  
inflammatio peripheria, dicitur facies rubor,  
imo post mortem cortex cerebri, quasi injec-  
tus, ruber invenitur.

### Curatio.

Cum sumus sit aestus, dissipatio liquidum,  
residui inspissatio, corporis scititas, humo-  
rum in putredinem degeneratio, quare  
humectantibus, diluentibus, Efficiamus.

Acti calor, ex pulvinaribus vitetur. aer  
sit frigidus, situr corporis erectus, et  
nisi debilitas prohibeat, seceat ceteris in sedili,  
aer frigidus exproposito.

Potus sit cognosus, de noct. horb. avena,  
c. succ. citri, aucto, rob sambucc. emulsionis.  
pulverula, crem. horb. aven. c. succ. citri aucto.



Si jam adeo cuiusdam partis inflammatio,  
frigidus potus vitetur.

Venefectio initio, sub remissione symp-  
tomatum celebratur in manu, siq. urgeat  
delirium, in pede. Si vero frigus adeo  
extremorum, internorum aëther, vitanda  
cum enim parum sanguinis in arterias  
extremorum pellatur, parum recedit in venas  
prope hoc parum venis educetur, nisi  
angina, pleurisy, pneumon. suffocatio urgeant, hinc  
prostratio, ac symptoma leviori incipit, vena  
claudenda.

Clysmata sunt repetenda, ex oxymelle  
decoct. aven. c. Olio, 3s quater die, et  
repetenda, donec aëther mitigari lingua  
humectari incipiat. Tum ab omnibus  
refrigerantibus desistendum, ut nova causa  
subigere valeat. in delirio clysmata quib.  
ma, aëther enim demperant, et revellunt.  
Cumq. firmitate in hac febre obest,

ideo pulmone, nobis vapor & liquida<sup>133.</sup>  
trahatur, in corpore totum vapor tali  
exponatur, Troni epithematibus foveatur,  
subaxillis, parotis, inguinibus, frongie  
& liquida madida applicentur, ut ita humi-  
dum in sanguinem resorbeat. Si hemor-  
ragia novum vapore & liquida, procuratur,  
Supra picea lenitur.

Sub remissione datur cor. Peruv. in Tre-  
3/4 omni dihonio c. O. - decoct. omni ab-  
hora, cyanth. c. O. rob sambuc. ut ita  
paroxysmus precaveatur.

Hæmorrhagia novum nimia, n. venæ  
tione, at ligaturis artuum, ut sole vine  
comprimantur, ne tantum an cor cedat  
sanguinis, cuiuslib. piceis Chysochondris  
applicatis, dextro, si sanguis ex nase dextra  
fluit, sinistro, si ex sinistra, ind. estum tem-  
perantibus, emulsionibus, tollitur. Si vero  
hæc non juvent, et periculum jam iminet,



134. Iam linteum, solutione mercurisima  
Oli. alb. madidum, calamo scriptoris ob-  
volutum, narisbusz profunde intensum,  
calamo extracto ibi, donec post dies ali-  
quot fronte excidat, relinquitur, juvat.

quidam In plenus est pulsus, calor per-  
tingat ad extrema, color ruber sit in labiis  
et facie, non suppressus. si vero jam  
facies pallens, pulsus vacillet sistatur.

### De Febris Intermittentibus.

Quamquam in imo Paroxismo difficile  
Genus Febris determinari possit. Galien.  
In vult, in quotidiana, minus frigoris,  
calorem lentum, pistulosa excreta esse,  
Temperamentum Phlegmaticum, anni  
Ternus humidus. Tertianam introare  
cum majori frigore, calore mordaci, siti  
adese excreta biliosa, corpora cholericis  
prehendere. in quartana, sentiri, osium  
confusum dolorem &c.

Observata etiam sunt Febres intermit<sup>tes</sup>.  
terres, quintanae, sextanae, septimae die  
recurrentes, in quolibet mense.

Sunt jam et Vernales, quae Februario, et  
Autumnales, quae Augusto intuant. Hi  
Autumnales jam Januario minuantur,  
Vernales in Junio et Julio. Saepe serius  
intuant, ut Autumnales, in Septembri et  
Octobri. Vernales in Martio et Aprili cum  
viscida, acris per Hyemem accumulata lecto  
Veris deprore solvantur, febres accendunt.  
in Autumnis acrimonia in sanguine per  
aestatem genita, succi calore inspissati solvi  
incipiunt, eduntur e corpore, quare Autumn-  
ales difficilius curantur, ob bilem aestate  
acriorem factam, sensum factum sangui-  
nem, saepe periculose sunt durante non raro  
ad verem usque, contra Vernales. Facile sanan-  
tur, fronte non raro cepant. Autumn-  
ales obstructions viscerum posse trahunt,  
cachexias, Hydrops, quae in Vernalibus non  
observantur.



Sunt ad huc intermittentes singulis, dupli-  
cate, triplicate, continue, exquisita, notha  
extensa, epidemica, maligna, biliosa.  
hi non raro astus cum delirio ad 24. mō  
30 horas extenditur; quōdā sunt cum fopore  
exanthematibus miliaribus.

### Diagnosis:

Inajit cum ositatione, pānculatione  
sen membrorum extensione cum oblectamento  
succedit lassitudo, gravitas, totius corporis  
angues, pallens, livens, sequitur horripilatio  
frigus, rigor, maxillarum concussio, quā  
omnia autem motum turbatum, et  
sanguinem extremis stagnantem, in majori-  
bus vasis circa cor, pulmonem congestum  
divinit, quare frigori tempore fitis, mox et  
ob incalibilitatem sanguinis, exhalantium  
strituram, unde humidum non seernitur,  
Et est crassa, pallida, ob spasmum renum;  
quō jam magis frigus, major sequitur calor,  
et contrā. qui moriuntur, ppe semper sub  
frigore obierunt, in fletu, fletu, ob crasum  
sanguinem circa vitalia collectum; licet

Et in calore ruptis vasis in cerebro, Plethora  
obscure propiunt.

Sequitur calor gradu auctus, dolor capitis,  
et coloratas, minuitur anxietas, pulsus fit  
magnus, quia concretus frigore sanguis re-  
solvi incipit cum attactu, unde fit, tum  
ab attactu sanguinis, tum putrido, bilioso  
humore in primis viis.

Succedit defunctio, seu male subacte expulsi-  
o, et sudores, et sibilantofam, alvum vomitum  
solita vasa enim laxantur, corpus sanguis  
soluitur, maa cocta evacuat, et post somnum  
blandum remanet debilitas.

### Prognosis.

Mutantes sepe intermittentes in contrarios,  
tum ex calidiori adhibitis, tum si maa multafit.

Cum sub frigore solidorum elementa ad se addu-  
cantur, hinc rigida fiunt, calore itum laxantur,  
sepe in quolibet paroxismo, patet solida debere  
debilitari, relaxari, sanguinis vero flux, et o'ia aeris  
ora fieri, cum tempore Aprioxie solida laxa  
sint, sepe illa chyli assimilatio in sanguinem  
et attitus, sanguis ergo generatur tenuis, globuli



138. rubri non coniunguntur, facile dissilinas;  
unde die intercalari. Sudores frontanei, ob  
vasa laxa, et sanguinem tenuem, non com-  
 pactum; pallor, saliva viscida, humorum  
dum, chydrosis, cachexia, ob sanguinem visci-  
 dum. sepe concurrente vasorum laxitate  
oc. et Ebrii sanguinis exaltatis, scorbutus  
sequitur intermittens; sanguis fit aer, et  
tennis; quare sepe malo omine in Hyana  
sanguis ex gingivis fluit, naribus, tennis;  
coracineis; quidam circa palpebras erythinosos  
nascuntur, a sanguine vasis effuso, tum ob  
tenuitatem, tum acrimoniam vasa erodentem.  
Intermittens. 3o. Scurvus ex dictis causis  
Cachexia, Hydrogi v. Scorbutus sepius  
aut obstructionis visum, scurvi, ob  
vasa laxa, et sanguinem v. viscidum factum,  
et tennis et aerem.

Caupit quidam leucophlegmaria, pro a frigida,  
et putrida humorum indole pendet.  
Hydrogi vero a sanguine tenui, resolutio  
in serum; qui cum febre, et scirrho he-  
rubri prelosum.

Obstructiones. Hepatis, Lienis, oment, pancrea. 129.  
his de exiguas intermittentes, quae in farin-  
hos mutantur. Libentiam in obstructioni-  
bus, frictions abdominis, Iungr. de artha-  
ritas inunctiones, purgantias commendat.

Saepe intermittentes salubres sunt, corpus  
ab iduvie liberando, viscida attenuando, quae  
Hyp. convulsioni febrem supervenire, bo-  
num. imo obstructiones leviores, iteri ex  
obstructione Hepatis una solvuntur.

### Causa

Videtur esse inertia liquidi nervosi, dolet debi-  
litas, tremor ab inordinato spirituum influen-  
tendo; Cordis vires debiles, quae nequeunt  
ad extrema usque propellere sanguinem. in-  
certam quoque liquidi nervosi comitatus sangui-  
nis lentor, ex cordis debilitate. oritur ergo  
Paroxysmus, & ob incaluitatem sanguinis in  
extremis & majorem repressam canalium, ex  
spasmo & defectum potentiarum moventium.  
sed cum sanguini repente paroxysmo corri-  
piantur, impossibile est sanguinem tam subito  
incaluitem fieri, neque tam subito in solidis



140. rigiditas nasci potest, superestq; causam esse  
ans; quæ robur dat vasis moventibus.  
Si sepe a motu animi perturbatus, a terrore  
intermittens oritur; quæ non raro terrore  
denno sanatur.

Causa ergo prædisponens videtur esse in nervis;  
cortex enim decurans in roborando syste-  
mate nervoso, et animi motu compressendo,  
efficacissimus est, omnesq; intermittentes de-  
bellat.

Sentis et febres particulares: hî in Virō  
redibat Hemigrania quotidie, pulsus in  
corpo non mutabatur sub potissimo, al-  
circa oculum ibi enim dolor inhoans,  
sensum caput premit, ne venesatio, epispasti-  
ca, vesicatoria, elixmata, purgantia profu-  
ere, ad corticem cepit morbus. Cuiusdam omni-  
die brachium frigebat, tremebat, sequente  
sensum calore in parte, quæ omnia corticem  
aperere. ipse multoties dolorem capitis  
periodicum illius corticis sustulit.

Fluidum nervum excitatur a causis 1249.  
occasionalibus, ut mala dicta, aere, terrore  
vitiis di. ut non semper accedunt causa occasi-  
onales, et tñ pñ provocantur. redit febris?  
an qñ causa excitans fluidum nervum, in  
illo latens? & fluidum spiritum excite?  
in vivo sub actuali salivæ pergebat febris,  
non qñ oriri potuit a sanguine spisso, solu-  
tus enim erat argento vivo.

Non negandum quidem putidos humores  
in vitiis vitiis, conspersionem suppressam  
caritate suo, interim tñ redit febris, excipia-  
tiam har maa.

Videbatur qñ intermittens ab epidemio quodam  
miasmate nervi, spiritibusq; impactu excitari.  
sic Libenham epidemici quartanæ grassantem  
observavit, ubi tñ diversitas ætatum victus  
diversas febres producere debuisse! an qñ,  
si nullum vitium in solidis, neq; liquidis  
decegi pñ, spirituales dicende? certe febris  
qñ resistit a nimis evacuationibus. et  
sola idea & levissimus error in victu & externis,  
a febre in unum bin, semper febre corrigi.



142. Si lentam putat, Febres intermittentes.  
efficiat id, in cogenda, & evacuanda causa  
morbi; per paroxysmos, quod continuat per  
dies; quare si continua 9 & 14 die solvitur,  
intermittens quidem genus 9 & 14 paroxysmo.  
ad eam intermittens id paroxysmis facit, &  
continua diebus? fors nam semper die  
intercalari colligitur excitans paroxysmum  
sequentem; app. quadrante ante febrem hunc  
sanissimus videtur, quare nam citius non  
excitavit paroxysmum?

Spiritus ergo excitari videntur a fomite  
morbofo in omni vis, visceribusq. abdominis.  
collecto, saepe enim febris sumitur, si  
sanguis per febrem viscidus & acris tenuis  
factus est & digestio adfit vitata & visum  
obstructio. non raro tñ nullo praesente  
vitio in solidis & fluidis, febris tñ recidit.  
ideo Anthonnalsi restinaciores humores  
enim nostri aere humido-frigido vitantur  
cachectici fiunt, transpiratio suppressa, frigus  
vibilis astate lentorem contrahit, qui lentos

obstructiones hepatis, lienis producit. 143.  
Vernales vero ob puriorem aerem, transpi-  
rationem melius procedentem, fri fronte  
aspiciunt.

Si mæ pethinarios, copiosos, q. in ut uno  
paroxismo evacuari queat, febres sunt Epli-  
catæ, Zymicæ, continuæ, extensæ &c.

### Curatio

Aër temperatus sit. Dieta sic intercalari  
paulo plenior, vitando omnia dura, cruda.  
Breui ante paroxysmum cibi vitentur, non  
digeruntur enim a nra morbo occupata.  
die intercalari modicæ excitantia, vinosa  
dantur, ut excretionis promoveantur; som-  
nus sit longior; motus corporis conducit.

Febris non sistatur statim coctæ, sepe  
enim ab adustis humoribus, bile tenaci acia  
præcordia hærente, obstructionibus viscerum  
Anthummo oritur unde, quæ suppressa, corpus  
langues, Cachexiam contrahit, Hydrogum, et  
Scirrhus viscerum, iterumq.

Sæpe in observari, Diuturna febre, aqros  
in Cachexiam asilem, tumores pedum inci-  
dise, et febre non fugitæ, in pectus misce,



144. convalescere in brevi, prescripto cortice  
Peruvian. cum resolventibus, amaris,  
Olibris, interpositis, p. m. junctis lenibus.  
purgantibus, aut q. v. illa, et ita p. m.  
cessante febre, remissae Cachexia, Chydrops.  
Non raro enim agri non propter obstructiones.  
quas multoties non inveni, a p. m. diuturna  
febre, humoribus factis Cachectici, et solis  
debilitatis, in Tumores inveniunt.

Aliquot ex febre diuturna factos chydros.  
spicos, sine gravibus viscerum obstructionibus.  
cortice, cum amaris, lenibus, purgantibus.  
et q. v. illa, in vino infuso curavi feliciter.  
observari, sopita febre, brevi ab Hydropi,  
tumore pedum, Cachexia liberatos, et  
contra redeunte febre, brevi iterum intra  
misse, ut diu cortice opus fuerit, non  
ergo semper ex obstructionibus viscerum, sed  
sepe ob diuturnam febrem, humoribus factis  
viscidis, et solis debilitatis agri in  
Cachexiam, Tumores pedum, asiten et in  
cibum, tum cortice cum amaris, et lenibus  
in abdomine evasatam, tum per alvum

Quam Dinam ducentibus opus est alio. H. S.  
egri in pejus runat. Solto etiam simili  
infuso vino gum. \* addere.

Ante Paroxysmum aliquot horis dentur  
Salia, quae aequabilem per omnia vasa curi-  
lum promouent, et lentorem solvant, ut sub  
paroxismo melius moveantur, ut: diluentia,  
aperientia, Olea neutra, alkalina, amari-  
cantia, ut rad. cythos. contrayerv. serpentis.  
virginianae, maxime in yna, in mucosa &  
frigida semper. in calidioribus rob. sem-  
buri, reborum converit, in yris, ubi  
putredo metuitur.

In febre Autumnali cum humorum  
visciditudine, bile per astatem adusta, si  
eger flavescat, & adnata, cum F. nra flavo-  
rubra, anasitos circa praecordia, obstructi-  
ones, viscera adfint. rad. Paracoron. cythos.  
gram. Scorzon. cum Oleo polyest. 7 ro  
Ole. & rob. samburi. large potetur, item  
Semen lactis cum dictis cortum, & fronte  
sepe sabura soluta, alva vomit. ejicitur,  
quidq. arte opus est. Abdomen bi. de



146. pannis callidis fruetur, et chondrochorda,  
Sung. solventibus innungatur & emplastr.  
Silenel. & de cyenta legantur.

Si ob solutorum laxitatem, fluidorumque  
tenuitatem agri. hore effluant debilitante  
adstringentia in vino rubro, austero infusa ju-  
vant, ut cort. chire, Samarisp. capparum.

Si nausea, ructus, vomitatio, halitus, foetibus.  
anxietas, tensio molesta circa praecordia, hy-  
pochondriorum intumescencia, oris amarus,  
vestigio ventriculi morsus. de. mra fuviente  
febrem praesens, sive febre genita, evacuetur  
vomitu; alio si. lumborum obtusus dolor,  
borborismi, flatus, abdominis tumor, sibi  
em. eluta, putrescens, diarrhoeas, dysen-  
terias excitabit. propter et dysenteria pro-  
mitti. vomitoria regere quod debent.  
a purgantibus nimis, in specie drastica  
cavendum, febris enim restrainior redditur,  
nisi si nulla mala praesens sit.

Viro ingratissimo tertiana extensa biliosa  
cum delirio laboranti, venesectione praemis.

520 cum vomitorium ob contraindicationem  
propinari non potest, dedi cort. Peruvianum  
in decocto, cum Oleo amygdali, et intra  
breve tempus, nam biliosa alvo sensim  
educta, convalescit.

Si frigus grave periculum minatur, in  
senibus praecipue ante paroxysmum dantur  
infusa calidae, pediluvia, balnea adhibe-  
antur; in paroxysmo frigoris, itidem infusa  
calidae insistentium.

Venefectio casu prodest, si plethora, corpus  
juvenile, estus ingens, delirium. in biliosa  
vero tertiana extensa, nec parva fere est.  
imò si et vomitum, et venesectione opus,  
praecedat venesectio, ne fors agitatio vomitu  
excitata, et plethora praesente, sanguis ad  
caput pulsus, vasa rumpat.

Algoris, exortus sum, sub frigore agros  
gravissima tussi pectus corrigi, sensim calore  
accedente evanida, tum leni, quia stoma-  
chica, tum mella, si quia stomachi affecti  
adfini, vomitum illico tollitur.



148. Sub calore, temperantia, Ofa, decorta  
aven. horb. acetos. cum rob sambuci  
conducunt.

Sub crisi, cum sudor, et sedimentosa pro-  
dit, dentur leniter diaphoretica, infusa  
calida flo. sambuci. horb. ac.

Mania, deliria quaedam, dydrops, cache-  
xia ac. post diuturnas febres, his jam cessan-  
tibus, exorta, cum a debilitate solidorum,  
visceribus humoribus pendant, corroborantibus  
amoris, Olibus. lixiviosis, ut Oleo fig. fabarum  
geniste in vino solutis curantur, et victu  
analitico. Hydrops in apus habet infuso  
ex amoris, lenibus purgantibus, et spiritibus,  
aditis Olibus.

Curatis. Febribus, proterpine Anthusmalibus,  
aliquo tempore solventibus, amoncantibus,  
et quin. resinosis insistentium, ad totaliter  
solvendas obstructions, remedia bona dicta,  
et cort. china praevenietur.

Sub parossismo quodvis terrifica urgent symp.  
tomata, in specie in intermittentibus biliosis  
malignis, extensis, ut convulsio, aphonia,

Sopor, exanthemata quodam conungunt, 149.  
tum utiq, churia quiescens, vesicatoris do.

Quandoq, frigis. tantum est, ut incalescere  
aeger nequeat, et suffocetur; succurrendum tunc  
est, lateribus calefactis, plantis pedum appo-  
sitis, internis infusis, callidis, frictionibus.  
callidis ac.unctionibus sine dorso.

si dolor fixus, continuus, ardor internus,  
inflammationis hepatis, vel alterius visceris, signa  
vitetur cortex.

si vomica hepatis, vel pulmonum, una  
sepe post albam suppurationem incipit, oritur  
febricula intermittens, quotidiana, vel tertiana  
ane typhum ludens; cum sit febris  
suppurans, non sistatur cortex, saluta-  
ris enim est.

Febris anthraxialis, ab obstructione he-  
patis, ut post aestatem ferream, torrida, fac-  
to sanguine, oculis icticis, Linga sufflata  
gravitate circa praecordia, obtuso dolore  
hypochondrii, orta, cortex minimè  
sistenda, salutaris enim est, ab sabarra



150. primarum viarum educta, & sicut fatu-  
raturum decortum in  $\mathcal{V}$  sicut luti, rad.  
cyth. Taraxac. gramin. 5 rad. asientium  
cum Ole polyest. 700 Ot. rob sambuci,  
addita, in majori obstructione, rad. Helleb.  
nigri, fol. jenn. & R. Bap. Helleborata,  
caeterae chypochondria ferientur, iungantur  
enclap. Jileneb. & cicutae regantur. Li-  
qua febris cortice pignetur, aeg. tota hy-  
eme languet, obstructiones obfirmatas,  
Schisthus, chydrops excipiet. Li. q. ex usu  
cortice aeg. languet, adnata flavescat, gravi-  
tas circa praecordia adsit, deprimendum ab  
eo, & resolventibus insistentum, gum. Xev,  
decort. cyth. Taraxac. &c.

Leptam febris, purgantia revocant,  
quae vitentur.

Ad curandam febrem sepe 3iv ino plu-  
ribus opus est, si aeg. medicamenta recusat,  
& sumere nequeat, clysters ex cort. chine  
eductis prius potibus. Asmate domestico, pu-  
more non raro profunt.

Adstringentia ut alumen, cum resolventibus si  
amoris mista, sequuntur intermittentes. cave  
in ab his, praesentibus obstructionibus visce-  
rum.

Saepe, cum periculosa sub praesidio us-  
que symptomata, cor. febre sequi  
opus est, tunc obstructiones viscerum adfuit,  
quae sequitur febre curari debent.

### Phrenitis

Cum a causa interna, in morbo, sensorio affecto,  
idea excitatur, non correspondens causa externa,  
sensui afficiente, ideamq. mediantibus nervis in  
cerebrum deducente, delirium adest. Idea  
excitata v. placid, v. diffidens, unde delirium  
jocosum, ferox, meticulosum, terribile, spe-  
taculosum cum admiratione, triste cum fleu-  
re. ideam enim excitatam sequuntur animi  
affectus, id, tristitia, risus, admirationis et.  
quos aegri vultus praesentant. Saepe de-  
clinant de his, quibus sani occupabantur.

Phrenitis qd est vera inflammatio cerebri,  
v. membranarum ejus, cum febre continua,



152. acuta, et delirio perpetua. Saepè enim  
in acutis, inflammatoriis, ut pleuritide  
delirium observatur symptomatium.

### Diagnosis:

utrinque delirium tam symptomatium, quam  
idiopathicum. Dolor capitis continuus, cum  
febre, et calore capitis, pulsatione in interno,  
ob meningis inflammationem, cortex enim cerebri  
non dolere, in fungum enim excreta, abs-  
cindi potest sine dolore. rubor adest  
faciei, oculorum, ob majorem sanguinis  
ad caput affluxum, et in Carotidem exter-  
nam; somnus. Involuntarius, coma vigil, cum  
terrore, ob affectum cerebri, et ideas for-  
tes excitatos, evigilant acri; delirium,  
idearum enim ortus in personis, non responde-  
ntis externis, si idea levis sit, est deliri-  
um facile, si acri increpetur, fortis, usque nullis  
objectis externis deliri potest, ferocitas, et  
oblivio omnium, collectio floccorum, ideae  
enim varie representantur, ferocitas, oris  
et sanguinem interibilem et partem dysphagi-  
tam, et vasa minima constricta; oculi

Siccī, pulverulenti, & splendentes, fixi. 153.  
cc.

Causae.

Abusus spirituosorum, capitis. Soli expositio,  
vigilia nimia, ira, &c. quae inflammationē  
superum sanguinem faciunt, et commovent.

Quartor sepe febris epidemica inflammā-  
toria, in Pleuritide, Peripneumonia, Angina,  
maxime proclivis ad Deliria. hic cum  
sanguis in arteria pulmonali stagnat, cor  
ventriculus dexter se evacuare nequit,  
sinister regit sanguinem ad caput pellere,  
unde jugulans se in Scabrum ventriculum  
plenum evacuare nequeat, sanguis ergo  
in capite remansurus vasa inflammat.

In Phrenitide ergo symptomatica, et vera, a  
crasso sanguine intencibili lingua apparet  
nigra, ob vasa exhalantia gangrenata.  
Tua alba, focius alba, quia Olij, &c.  
acria, ob praesentem retinentur in sanguine,  
egri, si causa praesente, sepe non sentiunt,  
cum sensorium turbatum sit, non sentiunt  
ergo situm et malum est, hinc invitis sepe  
potus probetur.



154.

Sunt jam ideam ab extra excitatam,  
sequitur apprehensio, judicium, ratiocinatio,  
compilatio, diffidentia, metus, ira, amor,  
risus, admiratio &c, ita ideam intrinsecam  
a sanguine in cerebro stagnante animi af-  
fectus sequuntur, plane si fortis sit, ut  
nullis objectis externis deleri queat.

Pervigilium a levisima inflammatione  
Cerebri oritur. in Phrenitide vero medulla-  
ris cerebri substantia afficitur, ibi ve-  
rida imprimuntur utroque initio nervo-  
rum. Pulsus est durus, ob sanguinem  
compactum, et finis arteriarum obstructo,  
membranoz affectas, dure matris, qui si  
tremulus, undosus, inagligiat, cerebellum  
affectum monstrat; raro autem durat  
in Phrenitide, quoniam cerebellum brevi non  
natiatur, ab eisdem enim arteriis ramos  
habet, hinc sanguis ingredientium circu-  
lationis in cerebro raris major copia  
in cerebellum ruit. Respiratio sepe rara,  
quasi aegri circulationis obliuiscatur.

Vultus Torvus. ferox delirium indicat, 155.  
futurum, talis enim observatur in Janis  
iratis.

Hic idem sanguinis per naves, impulfus  
ad caput ducit, ut cum sanguis per cras-  
sum, quidem arteriam ad effluere nequit,  
unde larga hemorrhagia optima.

### Prognosis:

Morbum hunc periculo plenum, raro ego  
fuisse, raro quidem semper supervivisse.  
Sepe in maniam incurabilem determinatur,  
sanguis enim vasa prope lymphatica in-  
gressus, difficile resolvitur, et dissipari so-  
lito una cum vasis concrevit, accedit, vasa  
minora, a urgente crure, comprimuntur, con-  
crevere, unde in edicibilis mania, stultitia  
furoribus, amantiosis. Sanguis item eadem  
cognia, ubi statim sano, ad caput impulsus,  
per pauca numero vasa fertur, alio impu-  
sus, coactis existentibus, et celeris cir-  
culatione; hic post pleuritidem ab eadem causa,  
sepe concreto cum pleura pulmone, asthma  
remanet incurabile, ab Hepatide libens.



156. quandoq; malo eventu in lethargum de-  
-positis, acuto humore inflammatorio, &  
-secrectione spirituum intercepta, nervis  
compressis; quare Hux. lethargo delirium  
accedere melius; qm delirio lethargum.  
Sed dum febris, & cephal. minuitur mul-  
-tum, tum lethargus excipit. quodque  
-in Catortum mutatur, deq; repente  
eundem statum retinet, quem ante habebat,  
nerv. pres. fors ob maiorem compressionem  
dum rurs. in sensorium redire impediuntur,  
imo & sanguis; & sequitur omnium musculorum  
convulsio, quare in mortuis arterie sanguine  
turgentes reperiuntur. quidam Catortum a syden-  
-hama & violenta rum in musculos explosione  
derivant.

### Signa periculosa, & Funesta

Vomit. bilis; nisi oriatur a praesistente saburra  
in rimis vis; periculosa est, cerebrum enim valde  
affectum testatur, vide vulnera capitis.

Sputa. frequens, etiam in adstantes; valde enim  
appellitur sanguis ad caput, hinc & in glan-  
-dulas salivales, ab arteriis Carotidibus; externis  
ramos habentibus, quare saliva sercio major.

Tremor. qui oritur ab incubili sanguine 15%.  
in cerebro haerente, & spirituum influxum  
in nervos impediende, turbante, cerebrum  
comprimente. imo sanguis lateralia vasa  
tubulipima lymphatica intrans cerebri me-  
dullam irritat, unde Tremor, quare post  
mortem cortex imò medulla cerebri, quasi  
injecta, rubra apparet.

Flvus. Urae, intermixta, & alba, cruda.  
ob spasum dum ductus choleodochi, dum  
tubulorum renalium, quare tñ bilis, qm  
o% & Ocia cum U eliminanda in sanguine  
remanent.

Convulsio, medulla enim cerebri pñ afficitur.  
anis, medulla cerebri ruditer tractata, statim  
convellitur.

Oculi pulverulenti, seci, impeditur enim huius  
mudi, ob sanguinem crassum, in oculos secretio;  
Sic in oculos invadunt, non nictitant enim.  
angulus, neq. sentiant, quare lethale est.

Stridor dentium ob convulsionem musculorum.

Stis defectus, praesente sititate, sensorum enim  
affectum est, sed sibi non sentit ager.

Ingens varietas Saporum, sibi variis, visis  
variorum. haec cum non pendant a mutatione



158. nervi in superficie externa, indicant ner-  
vorum originem in cerebro mutari, saltem  
ideam representare; minima enim fibrilla  
nervosa in superficie externa, a cerebro habet  
originem; ob curvum enim turbatum vix  
ideae origini nervorum imprimuntur, ob eorum  
mutationem, saepe in partem, ut nervo in  
superficie externa affecto, ideo ad cerebrum  
non deducatur; fortior enim ibi origini  
nervi impetu, ob caetera mutatione nervi  
vinci nequit. Sic etiam in Comatosi ob com-  
pressionem nervorum, nisi nervus nudus  
in extremitatibus afficiatur, ideo ad cerebrum  
non deducitur.

Pathematicum perturbatio, dum ex more flet,  
more ridet, irascitur, gaudet, inequali enim  
est cerebri affectio.

Ulcus antiquum, si fuerit, pallidum, lividum  
fuit, vita enim cessat, circuli, sanguinis  
usque ad extrema. Hoc etiam in aliis Chronicis  
vixit. imò si in fanis, ulcus antiquum non  
se consolidetur, morbo Cerebri brevi sequetur.  
Phrenitis, Peripneumoniam & Pleuritidem  
exapiens, Cerebri, per inflammationem enim  
quiescentem sanguis pertransire nequit, hinc

neque venosus à capite redire in cor dextris, 59.  
evacuari potest, stagnans ergo in cerebro,  
deliria confert.

Propter hunc variolæ delirium primum.  
quod p variolæ obsequium est cerebrum & in  
ferre in confluentibus, à reabsorbto pote  
inductus cum febre acuta, & copiam  
malæ variolose indicat, cui superscissio non  
sufficit.

Delirium à metastasi malum. ubi angina,  
Pleuritide ac evanescentibus sine Crisi,  
ager in delirium cadat.

Agrum laboriosum esse in Phrenitide solii.

Itaque peragere opera malum. si hæc  
in delirio conabatur, nescit, & mortua.

Primum si ager infidiamum metu non doctus  
nisi vano veneni metu omnia alimenta  
& medicamenta repellat, tum brevi moritur.

In defunctis dura & pia mater, sæpe  
cortex cerebri, nârlita gregens, totus tu-  
ber, quasi injectus apparet. in aliis, qui  
ex hoc morbo reconvalescunt, & alio dein  
obire, præ dura mater crassos nârli  
repe, quasi opæ observata. imò non



160. *multum vasa rumpi posse sanguinem  
extravasa. inde gangrena Phreni-  
dem excipit. vid. Boneti, Sculchre,  
tum Anatomicum.*

### Causa Proxima

Inflammas dicitur *h* pia mater, quae  
facile cortici cerebri communicatur, qui  
a pia matre, inter infractus cerebri se  
infringente, vasa habet; medullaris sub-  
stantia difficilius creditur, si tamen inflam-  
matio, ob errorem loci, sanguine vasa sub-  
tilissima. nudata ingressu, convulsio.  
sequitur.

### Observatum

erat, variabilis aetate, quae, haemorrhoidibus,  
doloze ad Testes, externum, manus, pedes,  
ingrinas, veniente, haemorrhagia, nasum,  
sudore, alvi fluxu, Phreneticismum solutam.  
ita et alios morbos. Capitis, et maniam,  
melancholiam, Epilepsiam, doloze Capitis,  
contumaciam et. quidem sanguinis a  
capite, ad inferiora revulsio. Haec autem  
cum euphonia, et diminutione delirii  
accidunt, necepe est. nasum haemorrhagia  
optima est, quia in corde sanguis alter.

opus effluit, cum non fiat ad partem 66.  
tantus impetus, ut sanguis retrogrado  
motu majora vasa ingredi. si vero  
in gangrenam & suppurationem termi-  
netur, lethale est.

### Curatio.

fiat venesectio in pede, cum sepe hemorrh. + Tem-  
idibus solvatur morbus; si sceler. vena jugu. fiat Cur.  
loris, & arteria frontis; narium scitificatio. decortico  
bona est, non raro enim hemorrhagia narium decortico  
solvitur. Phrenitis. venesectio manus, scari. entatis  
ficatio Scapularum, ligamentum post auris. Collo. ta-  
appositio pulchre seque profert. modo fia-  
Interna sunt diluentia, decorta, tempe- per vena  
rantia. Osa. decort. aven. hordei, altheda, Jugulare  
cum succo citri, &c. Ol. Resoluta

Revelentia. purgantia antiphlogistica,  
clismata emollientia &c.

Relaxando, fomentando anum, provocentur  
hemorrhoides, protuberantes, aspersis foliis figi.  
sorientur, donec sanguis fluat, & hirundines appo-  
nantur, & cantharis ageriantur, cum seque he-  
morrhoidibus solvatur Phrenitis.

Naris, oculi, aures, laxentur fomentis,  
vapore Va tepida, ut relaxentur rami Carotidis.



162. externe plus sanguinis capiunt, cerebrum  
eodem liberetur, naresq; ad fundendum  
sanguinem laxata profluentur.

Cognat serafum foveatur oxycrato, acilibus  
recenter dissectis.

Phrenitide mitescente, manente tñ quodam  
delirio = vigilie si urgent, opiata profunt.

huc spectant pediluvia, involutions, re-  
dum in linthea decub. emoll. medica, item  
acupuncta fovee, scarificatione inferioribus  
partibus apposite, epispastica plantis  
pedum apposite, ne tñ acia post angu-  
lant, circulum in toto corpore. Item  
febre parva existente, vesicatoria.

Astus videtur, inbedages crasso corpore  
veste indutus in scoli sebeat, pinguis  
et levis lectus.

Non raro sedato jam febrili impetu,  
delirium tñ manet = coma = debilitas uni-  
vers, cumq; her a debilitate solidorum  
orientur, tunc circulo per vasa relaxata tur-  
bato; quare videtur venesectio de vocan-  
dum, ad virtutem analeptico quousq; et  
roboratis foliis, fronte mala ceptant;

is eque obstrictur in similibus malis, post 163.  
acutos aliosq morbos, ex sola debilitate  
solidorum Potis.

Dantur saepe febres epidemicae ad Phreniti-  
dem proclives, cum tale delirium symptoma-  
ticum, (non tractetur repetitis evacuationibus,  
venesectionibus, ad clisteribus, astum temperan-  
tibus, fomentis pedum plantis, applicatis, epispas-  
ticis, situ corporis erecto, ne sanguis caput  
petat; si febris mitis, vesicatoria pedibus  
ambobus apposta, felicissima caput per  
multoties, alius saepe cantharide scapulis,  
apposta, frigida, scarificata, item chirodine,  
post aures, vivant; non raro bene curantur,  
semora, scarificantur; cum morbus prima-  
rius non ferat venesectionem & purgantis,  
in specie, si metus & adsint exanthemata.  
Tons, coque fovetur oxycrato si acrius  
urget, in febre biliosa.

Ruis, in Phrenitide sive idiopathica, sive  
symptomatica, in acuto, obveniente, in Foemi-  
nis fluxu mensium in initio & suppresso la-  
borantibus, in Viris item hemorrhoidalibus, in  
senibus si Una sit tenuis, Utraq veram pedis  
secundum bono effectu. si vero Una sit colorata,



164. in manu eandem celebrat.

Bagliu. Loma observavit, in malignis febri-  
bus, cum sanguis mittebatur ex brachijs egi-  
in pectus melior, totusq morbi impetus seque-  
tur in cerebrum, atq deliria, furor, et  
impo sanguine ex pede, melius habebant.

Albus in Phrenitide magnus. Opi, emul.  
prohibet, dicitur. aver. hord. c. in O. iudu.  
alato temperetur. delirio et apu mitesciente  
emul. sem. popu. albi v. opio utendum.

### Angina

Ab anglo, est difficilis, dolens v. impedita de-  
glutitio, et respiratio, prout plus larinæ, et  
eius musculi, v. Pharinæ, cum proprijs musculis,  
tum in - tum externis afficitur.

Larinæ musculi interni inflammati, Cynanchen,  
externi affecti, Paracynanchen,  
Pharinæ interni, Synanchen. Externi  
Paracynanchen, constituent.

Melior. v. Paster. deglutitioni et respirationi  
interferentes, tunc inflammati, summo malum  
supra Pulmones, in larinæ v. Pharinæ herent,  
generali nomine Angine dictantur.

Epistolarum in Angina bene dividitur, pro. 165.  
in Anginam cum tumore externe in faucibus.  
apparente. 266. et Anginam sine ullo tumore,  
externe visibili in faucibus, respiratio in, et  
deglutitione laesa.

Angina sine ullo tumore, tum externo, tum  
interno in faucibus, apparente, describetur in  
Angina inflammatoria. dum adest, si larynx  
acutè sumitatem et interiorum membranam  
affert arteria inflammatur, multum extensus,  
et interius in faucibus. tumor et laesio apparet,  
sed color ingers, cum febre molesta.

Alia quoque species observata sunt, lethalis,  
ubi pullos faucium, siccitas, et tenuitas.  
apparet, absque signo ullo latentis, in interi-  
oribus, inflammationis. et licet quidam alij vis-  
dolor, et rubor in faucibus videatur, non  
tument in inde fauces, sed eger insignem  
sua hospitalitatis affatum monstrat. raroquidem  
occurrit haec species, et esse tantum post diu-  
turnos morbos, exhausto corpore tum morbo,  
tum variis evacuationibus. Li. Si denique



166. Post febris continuas, & intermittentes.  
diuturnas, similem anginam observavit,  
cum deglutitione primum difficili, su-  
perveniente dein rancore oculis, cavis,  
& facie Hygroatica, mortis iminentis signis.  
monet, causam esse morbum diuturnum,  
& evacuationes nimias. quare Astersis,  
interdum res rubros, neq. humor ulcus apparet,  
sed corpus aridum, exsiccum adeo, membra  
solvantur, aeger vix spiritum trahit.  
si considerentur morbi diuturni, & nimis  
evacuaciones, patet eam oriri, a defectu  
spirituum, sanguinisq. qui requiritur ad  
movendos musculos, unde muscoli, pre-  
mura inanitione resolvuntur, reliquumq.  
parvam sanguinis, in musculis paralyticis.  
dagnat, bestemini vi in musculis circulum  
promovens, & lethale est. ob deglutitionem  
enim lesam, corpus inanitum, atq. exsiccatum  
repleri requirit. fibres laxae roborari. ergo  
providetur talis angina, post morbos diuturnos  
toleratos, & evacuationes nimias. progressus, cuius  
non curatur.

Ap[er]e in sanissimis; absq[ue] ulla signo  
morbi progressi, subito impeditur deglutitio  
& respiratio, sine ulla tumore externo & inter-  
no in faucibus conspicuo, & posthumi grati-  
tate & siccitate, vocatur malum tale

Cataractus suffocativus; quod a subita  
in fauces, & asperam arteriam, mox lenta, vis-  
cida, ob solida subito relaxata, defluxione,  
oriatur; sunt enim in Coryza, saepe cum  
copiosissimo sero & acro tenui & viscidis fluxu  
membrana Schneideriana subito intumes-  
cit, ut ingressum aëris, per nases tam statu-  
los, procludat, idem fieri potest, si Cataracta  
le serum in fauces, pharyngem, asperam ar-  
teriam defluat, aëris ingressum in pulmo-  
nem impediunt. Vnum Coarctum pleni-  
tudo, qui propter lapiditatem nihil ser-  
vit mali, media nocte adu[er]sus vehementer pro-  
hendit Cataractus, ut, velocem fluxionis, im-  
petum sentiens quidem, mox in suffocaretur,  
antequam auxilium dari posset, post



168. mortem illius copiosa pituita lenta,  
viscida ex ore effluat. ex subita p<sup>ro</sup>-  
lytica quasi aspera arteria relaxatione  
factum videtur.

Schenkwis, in Catarrho suffocativo mortuis,  
sepe semper, in pulmone vomiciam invenit,  
quae subito rogitas effuso pure in asperam  
arteriam necavit.

In aliis Cerebri ventriculi, Lympha tum,  
tenui, tum viscida, pleni inventi.

In aliis Polypi in ventriculis cordis,  
circa initia arteriarum, aut venarum  
detecti. Si lamio alio fanus meningie  
circa laryngem, & fanus perisph. colorem  
cum deglutitione difficili, noctu suffocatus  
interit, & vomica in pulmone parulenta  
inventa est, quid si multam dupl. nullam  
haemorrhagiam ante passus, patet ergo  
vomica in pulmone locum posse, sine  
ullo signo apparente, hanc manifestante.  
Cum ergo in Catarrho suffocativo repente  
obeat, sepe semper, & causae ignotis oribus,  
sed medicam esse difficilem.

Angina cum humore in - v externo appa. 169.  
reri, est. v. Adematosa v. Catarrhalis cum  
dussi pura, molesta, affere ostendit enim mem.  
brana glandulis, humorem pro lubricatione  
internis, secretibus. obfita est, si huc de  
fluxio fiat humoris lymphatici, prosi acri,  
visci, membrana in tumorem elevatur, ut  
membrana Schneideriana cum dussi pura,  
viscida, dolore. v. Inflammatoria. suppurato.  
ria. Scirrhosa. Concrosa. gangrenosa. in  
glanias enim, si non resolatur benigna reso-  
lutione, v. benigna nec coctione, excocti-  
atione v. per vias varias, aut depositione  
per metastases, abit v. in suppuram v.  
gangrenam v. in glandulis in Scirrhos, qui  
sensim in cancos transierit. datur adhuc  
Angina Convulsiva, si muscoli laryngis v.  
Pharyngis spasticè afficiantur, talis in Tetano  
observatur, ubi convulsi musculi, maxillae  
ad se adducuntur, siq. caput deorsum dentibus an-  
terioribus, notum in os mittitur, hic in statu  
peroni, convulsi jam musculi laryngis, et



Pharyngis, reurgitat. idem in Epistotono  
in chondrochondriis, et Histricis, convulsis  
musculis. Laringis, et Pharyngis, observatus,  
a sola perturbatione generis nervosi, et summa  
per animi affectos, Obores. fortes. &c.

Tales tumores inflammatorii, suppuratorii,  
gangranosi, scirrhosi, cancrofi, adenatosi,  
catarrhales. &c. occupant

Lingvam, ejusque musculos. Si Foemina scro-  
bulica, ulcibus quodam laborans, sensu levem  
asperitatem in Lingua, quae subito tota in-  
flamata tumuit, circa radem plurimum cum  
febre acuta, ut tumor totum os occuparet,  
septa vena, distere acri. c. Pos. emet. anticoloryn  
injecto, et topico subadstring. c. Xto, cessit  
modicum malum; cum autem adhuc febris  
et tumor urgeret, denno vena secta, et distere  
acri injecto, curata est.

Linguae varicos habet musculos deglutitioni  
inferviens, qui in Lingua ipsa inflammatorie,  
suppuratorie, scirrhose, cancrose adenatose,  
gangranose ac afflicti, deglutitionem, una

si glottis & epiglottis comprimatur, respiratio 398.  
libenter cedunt. eorum musculi sub mento,  
vasis humoribus laedi possunt, et deglutitionem  
impedire.

Pejorimi sunt tumores scrophuli, cancerosi, item  
miliarii, pentomata, ateromata, si linguam  
eorumque musculorum occupent;

Palatum saepe inflammatur, suppuratur, gang.  
generatur, scrophulis, concretis, ulceratur, saepe  
oxostofi afficitur, velut pendulum Palati.  
num, dum deglutitio laeditur. non raro  
inflammatur Palatum, si dentes superiores ma-  
xilla id irritet, qui extrahendus, alios ma-  
lum curari requirit.

Tonsillae consistunt membrana mucosa in  
spiras convoluta, quae mucus pro humectatione  
ritum deglutitioni intervenientium, secretur;  
si inflammatur, viae pharyngis, et faucium  
arctatur, et deglutitio difficilis est, potest suppurari,  
gangrenari, scrophesce, ulcerari &c.

Uvula corpus conicum est medio veli penduli  
dependens, eorum musculi, possunt inflammari,  
et saepe cum aliis partibus, suppurari, gangre.



172. novi, scirrhosae, canescentes. Scirrhum  
nonnulli Hilban. vocant, qui increvit, ut dentes  
anteriores tangere, et deglutitionem impedi-  
ret. Saepe à melle, et sero congesto, tumet,  
saepe ulceratus. non raro increpescit multum  
abscondi debet.

Polypos narium, et externae in naribus, et intro  
circa uvulam dependens, conspicuus, degluti-  
tionem, et loquaculam impedit. possunt  
sive in naribus, scirrhosae, canescentes, varii humo-  
res, scirrhosae, atromatose, ulceroae ad nasi,  
que mala videntur esse. fungosae membra-  
nae Schneiderianae, et glandularum earum, dege-  
nerationes. hi in vesica interna parte  
sepe glandula circa orificium tumescit, et  
istam causant inedicabilem. Hi  
quidam à polypos narium suffocando, dum  
os aperiebatur, venit lingua tumida in  
conspicuum, velum pendulam anteriora  
versus detrahebatur, dum chirurgus velum  
discindere, ut polypos. conficiat et evelli  
posset, tentare, tamen suffocatus obit aeger.

*Polypos foras protrusos. exilibrorhini,*  
*Chromorrhagia & aluminosa, Olaus sibilus*  
*naribus tracta, quosimul expectantur ex*  
*solvantur prae, si adsint, excrecentia.*

*Si muscoli opis hyoidis lingue inserti,*  
*musculi pharyngis, aut esophagi inflam-*  
*mantur, convelluntur, paralytici fiunt, dum*  
*deglutitio laeditur.*

*Si muscoli laryngis interni & externi inflam-*  
*mentur, periculosissimum est, vix acuta*  
*adeo, suffocatio imminet, plane, si muscoli*  
*Thyroarthenoidei, qui glottidem angustant,*  
*musculi arthroidei, qui adducendo*  
*ad se cartilagine arthroideas, glottidem an-*  
*gustat pro sono profundiore & acutior pro*  
*glottidis dilatatione & angustatione, inflamen-*

*tur. Si aperiata, quae membrana interior*  
*musculosa inflametur, respiratio est difficilis,*  
*tumens enim angustatur, pracluditur via*  
*aëri pulmones intranti, imo et septum*  
*molesta est, dum quia assumpta, & asportata*  
*gam descendit, cui adiacet aperiata,*



194. inflammatum locum corinthiolum quod  
in deglutitione affixa arteria cum oss. hyo-  
idis. suspensum dicitur.

Si musculus Pharyngis interni & externi  
& ipse oesophagus inflammatus, paralyticus  
fiat & constrictus. in hydropsi, chylocho-  
driaci, deglutitio laeditur, alius enim  
ex potu in fauces perveniens, a thori mus-  
culorum, qui a cartilagine cricoidea ori-  
untur, per epiglottidem in oesophagum  
protrahitur.

Glandula oesophagi & affixa arteria immen-  
tes & scirrhosae, & glandula dorsales in-  
imide comprimendo oesophagum deglu-  
titionem laedunt. glandula scirrhosae affixe  
ad arteria respiratori laedunt, tumq. aer  
ingreditur pulmonem, aegritudine cum  
fibris, ob obstaculum Aeris.

Angina ergo impediendo aditum aeris  
in pulmone suffocat si nunc glottis  
angustetur. deglutitionem impediendo  
exul motum accersit.

175.  
A quovis ergo humore partium respirandi  
& deglutitioni inservientium inflammationis,  
suppuratoris, gangrenoso, scirrhoso, altero...  
toso et ut paralytica affectione convulso,  
ingreditur aëris ingreditur in pulmones, &  
defensus ciborum in oesophagum, angina  
est dici malum.

Angina Aërofa.

Est Sapor albus, aquosus, frigidus ab ipse  
vulva inflammatione debens, magno vulva  
glandulis elongata, pellucida apparet, quod  
Tonsillae tumunt, pallent. occupat partes  
in deglutitioni magis, & respirationi inservien-  
tes. præterit corpora leucophlegmati-  
ca, pallida, debilia. quod est sine dolore,  
est fletu quod cum dolore quodam, et  
fletu lentum, quia partes a humore disten-  
duntur.

Angina Catarrhalis.

Catarrhi sedes est membrana illa mucosa, quæ  
nates internas, fauces, oesophagum apertam  
arteriam, uvulam, tonsillas, pharyngem, in-  
est, per ipsas glandulas, per semper aere



196. *feruntur, quod ibi corruat cum sero acri &*  
*viscido fluxu, ut non erodantur, quod*  
*viscidum, membranae à simili acri sero*  
*inflamatur, si jam laryngem & ipsam*  
*arteriam inflammas talis. Scrofa seu Catarrha.*  
*his praetendat, cum tunc molestissima*  
*respiratio labitur si pharyngem, sequitur.*  
*si in epidemico Catarrho, saepe tonsillae*  
*noulae ex tumunt, quibus tunc tunc tunc*  
*tendantur, alii capite obtuse dolent. in*  
*febris Catarrhalibus benignis & malignis.*  
*saepè talis angina observatur, cum mem-*  
*brana supradicta inflamatur à sero acri*  
*acri & viscido-acri.*

### Angina lymphatica.

adeo, cum vasa lymphatica à sero acri  
pro humore inflammantur obstructa, tunc  
à lingua urgente à tergo excitatur tumor  
adema, calidum dicitur, pedicibus, non  
rubeo, refertur ad Anginam inflammatoriam.  
si humor extravasatus laeet in mem-  
branam tenem fibras musculares invadentem.

Humor oritur non raro frigidus deglutitionem  
respirationem impediens. Talis observatur qd externe  
ab ope hyoidis ad acromium scapulae usq; et  
divisi calpeleo integumentis emulcatis qd cum  
deglutitionem, turbando musculos ophi hyoidis  
impediunt.

Tales humores aquosi, lymphatici, frigidi ori-  
untur quod in collo, si venae jugulares com-  
prope sanguinem in cor evacuare nequeunt. Li-  
quor ligand carni venas jugulares, et salivam,  
lacrimum fluxus humoris. Vbi in laringe  
invenit, canis angina suffocatus obit. Lingua  
a sanguine separata, sive ob circuitum eius. Cuius  
sive stagnationem, humores aquosi, vasa lymphatica  
diffundendo glandularum folliculos, producit.  
ex aeternitate, scilicet aeternitate et venas jugulares com-  
proimente humor, anginae oriri potest. ino  
glandularum imparis obstructis et glandula ipsa  
humores in collo, postibus deglutitioni, et  
respirationi inservientibus, oriuntur scirrhosi, cal-  
culosi, ob moem stagnantem, induratum.



Os internum fauces, pharynx, larynx, reliquæ  
 partes internæ, glandulis, exhalantibusque vasis  
 pro humectatione horum partium, donantur  
 pro quæ sunt linguis, blandum in statu  
 nati, gloriatur, et quasi in auras continuo avolat.  
 si jam frigore, et horum impeditur, stringantur  
 emporia, pergit serico à tergo, cum nihil  
 exconi possit, humectantur finis exhalantium,  
 soluta obstructione, limpha crassa excreatur,  
 patet id in coryza, et gravedine, quæ na-  
 rini graspat, si æstus subitum, foris  
 excipiat, quæ similis mala plurimum vere,  
 et autumnis graspat, et hyemes. prout jam  
 malum voris, membrana partes occupat,  
 ita et sternutatio, et coryza oritur, ut sepe à  
 humente membrana aëris aditus per naris in  
 gulmonem degeneretur.

In tonsillis, faucibus, pharynge si malum  
 veret, impeditur deglutitio, est cum angina  
 prosa, seu catarrhalis. in laryngem, aperturam  
 gulmonem decidua nam catarrhalis, asperum, et  
 respirationis impedimentum facit.

Jam pro ratione lymphæ, & feri, Catarrhus 179.  
catharus, & aeris cum febricula, & dysipetia,  
& Catarrhus frigidus cum exitione lymphæ  
viscida oritur, talis angina, si hos partes  
& aeris & viscida lymphæ occupet. ideo  
in chlorosis leucophlegmaticis ob circulum  
per hos partes. Tardum & sero seculo, talis  
angina oriuntur cum humore quodam, respiræ  
& deglutitione molesta, sine febre.

In tarda circulo seculum percutitur copiosum,  
in nimia cum asthma, ob vasa exhalantia contracta,  
ita calore sumo, & prolapsum humorum, nulla  
sed seculo, patet in ardente.

### Cura.

Angina apocæ, in debilibus, leucophlegmaticis  
cachectis, ubi humor & pus in laringe & pharynge,  
cum respiratione & deglutitione lesa, perfici-  
atur evacuatione lymphæ per album, & amo-  
nio, colocynthid. jalap. per Etnam, & Pri-  
mar. junj. frilla, oxymel. frill. sudorem,  
diab. aromat. apoplethmatis, sternutatoria,  
mephritica, rad. pyrethri, peris. Gingib. cordam.



Vesicatoria nucha, collo, pone aures, apposta.  
 Diata sit expicans, calefaciens, ex carne aspa,  
 abi cum herbis aromaticis, potus vini.  
 Codutiones oris sint, vino et herb. aromaticis.

In Angina Catarrhali, febris Catarrhalis sit  
 ratio, et calor; conveniunt Decocta Rad. bardane  
 scorzonera, sassop. guajac. angel. rorismar.  
 hyssop. valerian. gargarismata ex dictis. si  
 vero calor urget decocta humectantia mixta.  
 Ope vapor. & tyrida. catoplasmi. emolien.  
 & resolventibus; Supp. pect. minimum uogers.  
 requirit sp. de cynogloss. decoct. pto. p. p. thard.  
 ac. deniq. morbus Dracophoresi solvi debet.  
 Angina go Catarrhali frigida resolventibus  
 callidis. cum calore uso. guacha humectan-  
 tibus. Ope tractetur.

Angina lymphatica cum febre, tractatur  
 ut Angina inflammatoria.

Si malum ex obstructione, scrophitate  
 glandularum, indurac. & inspissatione lymphae  
 in glandulis oriatur, & alius humore. nō  
 abstrahente, stentomate, melioride cura diffi-  
 lis, si unquam succedit in specie, dum manibus.

acutus non datus. Lege tumore in faucibus 189.  
bus aperto, caliculi eucti sunt, ab hyphar  
sipa putabatur.

Tumor in cellula horis: apertus & sculpus,  
& corrosivo. h. Hypocrit. h. extremum vultu  
elongatum pro tumore respirarem & deglutiti-  
onem impedit, absindatur. case h. re  
vultum rubrum, inflammationem auferos.  
in quodam tumor scrofula sub lingua ortus  
qui in capsum purgantibus tractatus, sculpus  
apertus est, humoris albumini ovi simili edur  
to, fomento adstringente consolidatus, eximie  
dita deglutitio redit.

### Angina scirrhosa.

Lege parva glandula in faucibus, esophago  
interno, aspera arteria, vultu non raro, ex  
tonfilla scirrhosa. quodam annis tumor  
scirrhosus in pharynge & larynge ortus,  
sive per se sive propter inflammationem locum  
partium, sive talis tumor respirarem &  
deglutitionem impedit. dissipimus est  
malum, nam manibus huius non datus alius,



182. nisi glandula coli. Scirrhus mali confus  
fuit. cauteria actualia & potentialis applica  
tione in interno scircho non licet expectatio  
fieri nequit. Si videri possit huius scirrhus  
in faucibus, tentant quidam cum erodere  
000 Ol. Iosquam emolliente. separant garr  
garrmate, at vix succedit cura. Denique  
garrmate, si scirchus, sed in interno  
cura impossibilis. Si scirchus, sed in interno  
vix: cura velum pendulum, bonifilis, &  
novam. Hilban. Scirchum cultro abscin  
dit, cauterio actuali adurit, iostam emoll.  
Scurat.

Esophagus Scirrhus, si in eo unus scir  
chus nascatur, sensim angustatur, hinc adess  
tino solidum in deglutitione impeditur  
tum protuberantia adhuc transiunt, sensim  
autem tumore solida una cum mucositate  
munitur, aculeos tum mucositate causat. Esoph  
asumpta in esophago subsistunt, sensim  
eget, defectu nutrimenti, cum dein in  
ventriculum nihil deferat, marasmo perit,  
malum sepe per annos durat, Esophagum  
crescit.

Si refusa arteria à scirrho uno v. pluribus. 183.  
angustetur sensim refusus leditur, cum  
insol magna, aër cum sibilo pulmonem  
ingreditur ratiocens ad scirrhum, cum sibilo  
egreditur. Si strumosi, compressa effusa  
arteria, cum sibilo respirant. malum hoc  
incurabile est.

Glandula tumida scirrhosa vertebralis  
premeudo, angustant esophagum, malum  
tristissimum est.

Si scirrhosus in his partibus canescant cum  
dolo, malum incurabile.

Sunt scirrhosus, ita alii tumores atromatosi;  
scatomatosi; melicerides; fungosi; varicosi;  
alii excrecentia carnosae, circa has partes  
nasci possunt, cum respiratio & deglutitio  
omni impedimento; qui circa uvulam &  
tonsillas, velum pendulum, linguam con-  
fuerunt, citius curari possunt, qm circa  
frenum, citius curari possunt, qm circa  
frenum, esophagum, effusam arteriam, qui  
manibus accipere non datur.

Si Substentia scirrhosa in Pulmone genita  
concrecentia, pessimam pleuritidem cum Plepsi,



184. Ejectione humoris corrosivi tenuis, cum  
doloꝛe pũo facit, ininrabilem.

### Angina inflammatoria

Si aspera Arteria quoad suam internam  
membranam inflammatur, dolor non est  
adeo distinctus, cum sepe inflammatio no-  
tabilem longitudinem asperae arteriae occu-  
pit; angustata tñ a tumore asperae arteriae  
aëri ingressus procluditur; ideo vox est acuta  
aër i pulmone cum sibilo per angustata  
loca expiratur; vox adeo clangosa ob  
exsiccationem membranae inflammatae; dolor  
inter respirandum acutus; aër ob  
tumorem egredi impeditur, unde respiratio  
parva, et frequens, ut crebra ceruicē respi-  
rare cogantur. Cum Pulmo sufficienter  
dilatus nequeat, sanguis in eo stagnat, et  
ad cordis ventriculum sinistrum minori  
copia redit, hinc minori copia recedit  
in aortam, quare pulsus vacillat, in pleni-  
tudine decrevit, cum difficilima respiratio,

anxietate, ob impedimentum per pulmones. 185.  
circulum. Sanguis a capite rediens, imple-  
ditur per pulmones circulo venarum capitis, et  
tendens deliquit causat soporem. Tandem  
infarcto a sanguine Pulmone aeger suffocatur.  
Humor inest, frequens, parvis virgulis  
prostratus, enim sanguinis in aortam pellitur,  
cum prostratus per pulmones transeat. sed  
aëris ingressus in Pulmones ob angustiam  
a humore asperam arteriam impediri  
suffocantur. Febri virgulis acutissima, et  
Pulmo in hac angina ferre plus minus  
afficitur. aëris inest sepe sat copiosus  
pulmonem ingredi potest, sed ob humorem  
totus egredi nequit, aëris deinde malo Pul-  
monis infarcto, et inspiratio et expiratio  
cum anxietate respiratio difficili, qualis in  
plenitudine decrescente vacillat, sequitur  
suffocatio.

Larynx, cartilagine cricoidea, thyroidea,  
arthanoides, epiglottide, ligamento, et muscu-  
lis constat, pro ratione aperture glottidis,



186. *angustationis*, atq. plus minus Pulmonem  
ingreditur, vix plus minus est aucta cle-  
-gosa, profunda, sive antipissima, et stridula,  
dolor inter deglutendum ingers, cum sub  
deglutitione larix elevetur, et quasi sub  
lingvam elatus. clausura vix, et angus-  
tatio vixem fauces aucta; ob ingressum den-  
in Pulmones impeditum, hinc sanguinis  
in Pulmone stagnationem, facies est rubra  
torpida, livida, ob suffocationem ab angus-  
tatione, et occlusionem vix glottidis imi-  
tentem. Dolor adest in deglutitione an-  
tissima, multoq. major, qm in affec-  
tione inflammatione, cum glottis plus  
inter deglutendum sub linguam trahatur  
qm. affec- tione, lingua carum ingers  
exterior os premed oculi rubent, facies livida  
ob regressum sanguinis venosi a cerebro  
ob obstructionem in Pulmone impeditum.  
Labris adest plus minus intensa, sive  
antipissima, tumor, nec in faucibus, nec  
in collo apparet.

Sunt jam affera arteria inflammatio 184.  
perignitor  
quae per ad glottidem pergit, ita glotti-  
dis inflammatio musculorum quoque peruen-  
tissima. brevis enim a humore rima  
occlusa, hinc aere in Pulmones impedito,  
suffocantur. raro quidem hic sine febris  
occurrit in pueris. si tamen obremant, fun-  
destisima sunt intra puerum rotas sus-  
pirant, atque a se differant nisi in voce  
aethiori et stridula, si nempe larynx et  
musculi arthanoidei inflammantur, si  
enim affera arteria sola inflammatur, vox  
non est tam aethior, si vero aethiori, stridul-  
tatem ad glottidem pergit indicat.

Atque quoniam haec vox fieri et respiratio  
et deglutitio difficilima, cum aethiori vox  
aethiori, stridula, febris, dolor, tumor multus  
in faucibus et collo, habetur diagnosi, et  
prognosi funestas.

Haec sine febris gravis vocari solent  
Cynanche.



1888

Musculis opus Hyoidis, qui illud una cum  
 laringe, et apertis arteriis, inter deglutendum  
 sub lingua trahunt, inflammatis, respiratio  
 est saltem bona, neque adeo vox clangorosa, humores  
 neque in collo, neque in faucibus apparet, pro-  
 funde enim locantur hi musculi, saltem  
 initio si unus, alterve inflammatus, nisi  
 aucto malo gelatus musculus afficiatur.  
 malum est glosi culosulum. Deglutitio diffi-  
 lis est, ut seque convellatur pro dolore.  
 non raro repente humor evanescit, libere  
 deglutitur, abs brevi malum in Pulmonem  
 deponitur, cum stertore, orthopnea, morte;  
 rari ergo evadunt. seque initio inha-  
 rente febris, deest tantum dolor sub deglu-  
 titione, voxque altissima, sine ullo humore  
 conspicuo, quod in sensum augetur, ut propen-  
 se inflammatione tandem acutissima fiat.  
 fiat hic valida venesectio, repetita, cucurbi-  
 tis mellea applicentur, collum cataplasmatibus  
 emollientibus obvolvatur, dysmata repetita  
 pediluvia bona; venesectio in pede fiat,  
 si vero acutissima inflammatio cum febre, in manu;

Hæc sunt Græci: Paracynanche aut it. 189.

Pharynx ipsa latior pars esophagi,  
per quam fauces audit, in quam posteriora nasi for-  
amina patent; anteriori pendet velum pendulum  
cum uvula, amygdalis, columnis, muscularibus;  
fibris habet, quæ musculi glossopharyngei, thyro-  
pharyngei, cricopharyngei, stylopharyngei, pha-  
ringem dilatantes, & stringentes, cum assumpta  
in esophagum cadunt, volantes; esophagus  
est tubus a pharynge procedens ei continuatus;  
cum jam assumpta primo in pharyngem pe-  
veniant eum dilatant, ut respirationem esse  
salutariam, deglutitionem vero difficilem ita  
ut sibi deglutitio impediatur, assumptaq; pe-  
nares resurgit, quia partem inflatam  
contineat, ea se stringere laesa, nequid ciborum  
in esophagum propellere. non raro per  
petulam laryngis rimam assumpta in aspi-  
ram arteriam cadunt, cum rursi mole sitima.  
Febri intensa hæc plerumq; deest.  
si nihil deglutitio esse possit, adeo periculum  
a fame, expiratione, & putredine humorum.



Si oesophagi tubus solus inflammatus. primus  
actus deglutitionis cum assumpta in fauces  
perueniunt non est difficilis; at in oesophago  
ab eo potius deducta, et a tumore inflantato  
non tam facile ingreditur, evocantur de novo;  
adeo febris dolor maxime in illa parte ubi  
adesit inflammatio. prout Galenus:  
oesophagus est inflammatus. prout Galenus:  
in oesophagi inflammatione, cum is verberetur ad  
pharynx, in dorso dolor sentitur, tumor in melle  
exteriori adest. nisi cum pharynx inflammatus  
tunc ore aperto caliginis rubor, et tumor con-  
spici potest.

Si pharynx una cum oesophago inflammatus.  
et oesophagi inflammatio ad pharynx se extendit,  
et contra periculosum est.

Galenus: hec species Synanche vocatur.  
Frequentissime occurrunt in Braxi inflammatio  
vel glandulae Palatinae, vel glandulae Tonsillarum  
et columnarum a tonsillis ad velum. ex his  
et sola velum, tonsillae et omnia simul  
inflammantur. Deglutitio in hac specie impie-  
ditur, respiratio aequa inimitur si alio ore  
trahatur, quia partes humidae facilius angustantur.

Cum vero velum in parte postica productione  
membrane narium tegatur, patet, si valida  
sit inflammatio, membranam istam tumere, et  
angustare nares, unde respiratio laeditur; imo  
membrana hoc inflata tumente nares obtu-  
rante, ut sit in coryza, cum hoc à metastasi  
seri tumet, quod respiratio impeditur.

Maxime periculosa est hoc species, quia plus  
deglutitionem, quam respiratioem laedit; apesto  
ote facile inflammatio conficitur. periculosum  
est, si sine coctione mæ, et crisi, tumor repente  
disscedat, scilicet enim malum per metastasim  
in pulmonem deponitur; aut inflammatio in  
pulmonem, a pharynge propagatur.

Plurimum in his partibus, quod in larynge,  
et pharynge, a pharyge, a plexu arteria, contingit  
angina erysipelas, catarrhalis, lymphatica, seu  
edema calidum, inflammatoria quod periculosa.  
attentus enim seri in vasa profusi, et lymphæ  
in lymphaticis non est tanti periculi.

Angina quod erysipelas, catarrhalis, lymphatica  
omnes istas partes laryngis, et pharyngis occupare.



potest quae angina inflammatoria, et pro  
ratione postum affectum, periculum  
majus & minus. imo vari tumores in his  
partibus nasi possum, scrophosi, abscessu,  
stomatosi, cancerosi, aquosi. et. cum deglutitione  
hinc & respiratio impeditur.

Febris subinde ante hanc inflammationem, immo  
alias anginae fieri videtur, quae postea inflamma-  
tio per metastasim, quasi critica in hoc postea  
deposita apert. subinde hanc augetur malo  
omnis dem febris inflammatio hanc postum  
succedit.

si levis pars inflammatur, sive ab aqua auri  
viscida, in leviophlegmatia, sive a sero la-  
thyrali, sive lymphacalida, sive sanguine  
ad uvula sola & amigdala, et in aliis an-  
gine febribus. uno alterve musculus,  
tum febris & est lenta, annua, febri-  
tum in parte major chlor. si vero cum  
deglutitionis & respiratiois majori impedimento  
febris infuset & augetur, inflammationem mayo-  
rem fieri indicat.

Subinde q<sup>o</sup> dolor praecedit febrim, subinde  
 vero febris praecedit, et tandem mea quasi critice  
 in hac parte deposita, ut saepe in Abortibus  
 alijsq<sup>ue</sup> continuis contingit, primo dolor oritur  
 cum respiratiois & deglutitionis incommodo, siq<sup>ue</sup>  
 metastasi facta febris cepit, bonum, si vgo  
 augeatur, malum, necdum enim totam meam  
 criticè depositam, indicat, aut inflammationem se-  
 gere notat.

Genus: Haec febris Parasyneuche audit.

In hac febre magna mucosae copia fluidi ex  
 tonsillis, quae naturaliter pro vivenda degluti-  
 tione, et humectatione prostratum, mucosae pleurae,  
 quia partes inflammatae irritantur. haec in  
 Ophthalmia fluunt uberius lacrimae. in Coryza  
 leviter inflammata a sepe membrana Schneideriana  
 maxime, et saepe fundit copiose saepe corrosivum,  
 ob irritationem, putuita. Haec effectus est  
 potius morbi, non causa, ut vulgus putat.

Pro ratione Temperamenti, et Constitutionis.  
 Sanguinis. Et in his partibus inflammatio  
 varia. Si a sanguine bono copia recante



203. inflammatio oritur vasa. a pituitoso in Catarrhis  
Agrofa. a puro, in Catarrhis Obnoxio. a puri  
Catarrhalis; a lymphæ a tortu in vasa suis  
lymphaticis. inflammatoria sepe in suppurati-  
onem & ulcerationem, gangrenam, & scirrhum  
& cancrum transit, minus Angina agrofa,  
Catarrhalis & lymphatica.

Tuba Eustachiana orificium circa velum  
pendulum initium sumit, altero extremo in  
cavum tympani patente, cui malleus papæ  
inferitur, inflammato q̃ velo, Tuba malleum sepe  
comunicatur, eam irritando, opicula, & ædem  
in cavo tympani movet, quare ægri sub deglutiti-  
one in aure interna crepitus, Dolorem sentit.  
si Tuba hæc inflammatur & a tumore inflama-  
torio veli compressatur & in chronico muco  
obtusetur, surditas sepe sequitur. Si tubam  
a Polypo in fauces pendente, tubam sepe  
compressante, pro compressionis gradu auditus  
sensum minuebatur, donec cessat. in quodam  
alio in velo, & orificio Tuba habente, quodvis  
alius duranda obturabatur, toties surditas

acipit, amota turunda, auditus. rediit. 204.  
ablata q<sup>o</sup> inflammacoe, purgacoe, ulcere, tumore  
cessat furditas.

In lue venerea ab ulceribus hui<sup>us</sup> oris sequi  
croditur dubie origini, excrecentia carnea  
compressitur, callescit, contrahitur ror<sup>o</sup>, unde  
incurabilis furditas; si tota duba ulcetur,  
ad aures internam usq<sup>ue</sup>, crodatuq<sup>ue</sup>, cum  
sanis ex aure plorat.

### Prognosis:

omnium periculosissima Angina respirat<sup>em</sup>  
ledens; ut inflammacoe affere<sup>t</sup> art<sup>em</sup> & laringis &  
utrinq<sup>ue</sup> simul, intra paucos, enim horas suffo-  
cat. Minus periculosa solam deglutitionem  
ledens; libera manente respiracoe. Cum dolore  
acutissimo p<sup>ri</sup>mo tumore, t<sup>u</sup>m ext<sup>er</sup>no q<sup>u</sup>m interne  
in faucibus conspicuo, periculosa, deglutitionem  
enim impedit & in actu p<sup>ri</sup>mo, ut alibi p<sup>er</sup> n<sup>ost</sup>ros  
regurgitent & secundo ut evomantur, cum  
stomachus inflammatus est. maxime lethalis  
q<sup>u</sup>ia p<sup>ri</sup>mo omni tumore, t<sup>u</sup>m in- q<sup>u</sup>m ext<sup>er</sup>no  
respirat<sup>em</sup> ledit, brevi enim suffocat.



Quamvis haec angina descripta salutaris  
 costringant, in quodam plures partes simul  
 inflammantur initio statim, ut appaere aëreas  
 una cum larynge & pharynx una cum d. o.  
 phago; quodam inflammatio sequitur pluresque  
 partes afficit.

Si in angina respiratio impeditur, a humore  
 Pulmo minus caput aëris, quare expandi sed  
 nequit, hinc neque sanguis totus propulsum  
 in cor promptum redire potest, congeritur quoque  
 in Pulmone, accumulatur in corde dextro,  
 sanguis intus venosus. Ex jugularibus venis  
 lingua, faciei in cor dextrum plenum eva-  
 cuari nequit, accumulatur in venis encephali;  
 cor intus pressit sanguinem pedere in aëstem  
 quareurgentibus venis capitis, comprimantibus.  
 cerebrum, visus, auditus, tactus, hebetudo. ob  
 plenas venas faciei, & pulmonem oppressum,  
 pectoris adest cum summa oris, caput, fauces;  
 labia, oculi, lingua tumunt, livent.

Ubi vero respiratio non adeo impeditur, quod  
 partes inflammate tumentes, jugulares ex-  
 ternas, premunt vicinas, dum ab Encephalo

reduc sanguis per internas jugulares arin. 206.  
lari potest, dum interim facies, lingua, et  
oculi inturgent. Successive tñ accumulatus  
sanguis in capite turbabit actiones cerebri.

### Curatio.

Cum angina affera arteria, et laringis per  
antefixissima sit, curatio fiat per resolutionem,  
si enim gangraenetur, lethalis est, si suppuretur,  
cum synocha sub suppuratione tunc necesse sit,  
tumor incrementum suppuratus, eger suffocatur, ante  
quam maturecat inflammatio, et si etiam sequetur  
abscessus, ruptus, pus in affera arteriam lethali  
alter effundet. quare:

Venesectio in pede, manu, repetenda intra horam  
si non ante fiat inflammatio, large, etiam ad animi  
delirium convenit, praesente tunc, ut cum  
pulsus vacillare incipit labia pallere claudatur  
venae. Dum, cum venae frontales, jugulares, et  
canina tumeant, auge scientur, cucurbitulae  
multae applicentur. jugularibus. hirudines. me.  
cuius est languere egerum, qui certo suffocari,  
ideo large, et repetite mittatur sanguis,  
at statim initio, pulsus enim jam parvus, indige potest  
sed, parvulum illud sanguinem educatur c. damno.



Derivant purgantia fortiora, item quae  
 cito operantur, ut Ol. Angl. si vero deglutitio  
 sublata sit, vires praestant clismata acris  
 ex Ol. Angl. gemic, cum Diagrid. 4. Colocynth.  
 2. pro emet. primum. In venessectione administra-  
 ta, & minutis symptomatibus aliquoties.  
 quare Libentissime minutis symptomatibus  
 primo laxans praebuit. quod repetatur sectio  
 vend, donec mitescant Sympt., dein clisma  
 ta etiam omni hora repetita, emolumenta  
 & acris, item purgantia conveniant.

Vapor de Lepide & Secor. Hsb. emoll. ore  
 sepe trahatur, ubi vasa laxata obstructam trans-  
 mittant. Externe Cataplasmi. molliunt. cum  
 sem. fring. ad irritata cute man versus ex-  
 teriora trahatur, conveniant ideo Hypocist.  
 si tumor, rubor extra vergit, cum alleviatione  
 bonum. contra malum quia est inflammationis  
 augmentum, progressus ad externa.

Subinde. maca angina se nota per  
 metastasim ad pectus deponitur cum pectore  
 dolore quodam; subinde ad caput, Chyphothond.  
 fore lethali cum eventu. si vero ad

partes externas defensus, a sponte angina <sup>208.</sup>  
in inguina, pedes, manus, parotidis, bonum,  
et illis si pueri rubet, dolet, cataplasma emol.  
foventur, ut laxatis vasis, totum dyonatur.

Interne prout lactis, emulsionis, deionb.  
Hord. aven. c. sacro citri, scorzon. alth. lac  
c. tra tegide, semper progredietur. deglutitis,  
ne subleatas injiciantur. Hor per clisrata, ne  
sanguis exsiliatur. Quia, dum febris urget va.  
lida, conveniunt.

In inflammatione Pharyngis, cum respiratio  
sit utrinque bona, non est opus tam subito eva.  
cuatione per venesectionem, purgantia, et hec  
sensim perficiantur.

Partes cataplasma emol. cum sem. sinapi. et to.  
foventur, ut irritatio in ea ad extra derivetur.  
interna sint emollientia, Osa, acida.

Si Solus Pharynx novela, velum, tonsillae  
inflammantur, minus est periculi. venesectione  
in 2 purgantibus, clisratibus opus, si ac. q. re.  
repellantur, donec minuantur symptomata.  
huc emollientia, parva, scarificata, scapulis, vene.



209. = scilicet jugularium, vnde frontis, raminaum,  
chinidinum appositio ad jugulares, et conveniunt.  
item cataplasmata; liquida liquida decod. alth.  
malve, plosambuc. a. aucto, melle simpl. rosaceo,  
ys. alth. kernel. Otro. sine etiam cum  
gorgisatione, ore detenta. ex his injectiones  
fieri possunt. huc si ad. n. i. si inflatum ad  
sit valida cum febre. initio statim non  
repudiandas sunt repellentia, hi multi  
gorgoriat. ex aucto puro, et decod. rosarum  
ruborum ... aucto, melle, et solutione multa.  
gris tribui, vnde si hinc, frigida ore detenta  
his brevi liberati sunt, initio in statim  
his sunt, in homin. postum inflammatione  
vera, non adeo valida febre praesente.

Et de Angina pectoris, palatum, uvulam,  
Tonsillas, velum occupans, maximè in Scorbu.  
tis, quod tale malum epidemice grassatur,  
vere praesentem, aere humido-calido, praecedit  
levis febris, post horas aliquot evanida, fauces  
acriter dolent, si inspiciantur, videtur alba  
macula, cujus contigui limbes rubent, et  
respirare dolent, neq. adeo tument inde partes,

Si negligatus malum, sequuntur haec maculae,  
 halitus putridus ore exit, partesque salprofunde  
 eroduntur, gangrenantur. prodest virus  
 & p. cancrum, Ol. ardens & a dilutus cum  
 rob. sambuc. melle, sepe debet ore debentur.  
 Si os putridum halitum ferat, eroposque  
 sit profundior, rurs. Ol. marin. ardens. ad gutt.  
 xxx & 40 cum Si mell. ros. sequis. idem. brevi  
 sibi malum. in malo deteriori angustatur virus.  
 Ol. marin. doxi, at modicum separatetur. garga.  
 - rismata sibi ex flo. ros. rubr. c. aceto, & melle.  
 macula haec albescent, & flava, & peiores bruna,  
 circumscriptum rubre dolorosa, repente scroptas,  
 & gangrenantes. partes oris.

In Angina affera arteria & laringis, si  
 Pulmo reidum sanguine infarctus, id, qd. nosci.  
 - tur ex pulsu molli, debili, parvo, intermittente,  
 extremis frigidis, &c, sit bronchotomia admi.  
 - nistrari non moritur cum aeger nisi aeri via  
 praedudatur in Pulmonem, ad demum suffocatus,  
 nam in hac specie Angina sepe intra horas  
 aliquot suffocantur, & prius larga venesectio



277. aliosq. prout tentatis, & symptomatibus. In  
non minis. videtur, si gangrena imminet,  
neq. promittatur certa salus. In oris inflam-  
mationi imminet. Jugum yd, febris ablata,  
et tuba affere arteria. Symp. ad apertum oculo  
manu, si nulla imminet suffocatio, est ager tracto  
ore esse bene respiciet.

deglutitione plane ablata, ductis ordinario  
clismo. coenibus, clismata introientia ex lacte  
jussulis. cum vitella ovi, injiciuntur, quodq.  
pro calore dempsando clisteres. Os. cum mede.

### Angina suppuratoria

Si in suppurationem vergat, insistendum continuis  
gargasmatibus. ex sem. lini alth. maloe cum  
lacte ore detentis, et Cataplasmatibus. externis.  
Cuius autem sub suppuratione paulo auctore not.  
opus sit, ut sensim surgantur vasa suppuranda,  
hinc non discreto celebranda, et venesectionem  
hinc febris de symptomata sub suppuratione  
augentur, cum in duos ingessens. sub  
suppuratione suffocare possit, ideo qm. si in  
estus angia, venesectione opus sub febre  
suppuratoria.

Si abscessus maturus in ore videri potest,  
lanceola perforatur, raro extra vergit ad  
externe aggriri possit. Si vero in aëthra.

ego, & affusa arteria & laringe sit abscessus,  
pateat cunctis cum rumpi non possit, quare  
inodientibus insistentium. seque quidem  
Angina aëthragi & faucium suppuratus,  
ad affusa arteria & laringis diffinietur, prius  
cum aëri a tumore suffocatur, antequam  
suppuratus tumor.

Abscessus mundetur, consolidetur deat. hord.  
salvia cum melle rosar.

Brontotomia in Angina suppurata, apertio  
de febre, ne tumor suppuratus increpescat, suffocet,  
sed institui. ruptus. Un abscessus in Angina lar-  
ingis, & affusa arteria, prae effuso in Tracham  
fere semper aërem suffocat.

### Angina Gangranosa

Cum in Angina affusa arteria, laringis prius  
suffocetur aëre, antequam vera gangrena excipiat,  
in seque angina aëthragi, faucium, veli penduli



213. amigdalarum, unde gangrenatur, nositur  
gangrena futura ex dolore acutissimo, cum  
acutissima febre, subito audit, si haec per  
2. & 3. dies. Durant, neq. suffocetur. Eger, si sub  
to sine signis bonis omnia cessant, gangre-  
na adest, tum resurao, & deglutitio liberior  
fit, facis cadaverosa, frigis, livor extremo.  
tum, pulsus debilis inagis, in Angina fau-  
cum, vel ec. rubedo mutatur in albedinem,  
colorem cinereum, fuscum, nigrum.

Præterea subito cessat dolor, tumores in hac parte  
qui h. in alia oritur cum dolore, corpus callet,  
neq. pulsus mutatur, & bonum est, si talis  
metastasi ad partes ignobiles, externas fiat.  
malum, si ad internas, ad cerebrum & Pul-  
monem cum pectore, aut alia interna vise-  
ra, imò lethale fere.

Gangrena lethalis est, nisi parva possit  
gangrenetur, ut v.g. extremum nolle, qd  
aufertur fit.

Angina sepe, initio & toto morbi decursu  
obstinentibus validis, aluminosis tractata

in Larinum mutatur, ex quo cancer inen-  
trabilis.

### Angina Paralytica

Musculi deglutitioni copiosi seruiunt, sed  
ut hi actionem suam debite exercere valeant,  
cum per nervos à cerebro ortos influxum re-  
quirunt, si jam hic impediatur in musculos  
plures & praeiores, hi privati actione sua  
anginam constituunt Paralyticam, ut id in  
Hemiplegiis quodam, qui, resolutis medicis partibus  
corporis, musculis Difficiliter deglutunt, cum re-  
gurgitatione a sumptuum per naves.

Subinde sine causa patente musculi quidam  
deglutitioni inservientes resolvuntur, ut faucium  
musculi osis Hyoidis, ipse oesophagus, nates. In-  
mor, neq. dolor adest, sed deglutitio Difficilis, &  
omnibus musculis resolutis, saltem impedita,  
tunc marasmo acri present. musculis larin-  
gis resolutis sonus auferatur.

Sub Difficili deglutitione manus admoveatur  
anteriori collo, sub observatur, quod musculi reso-  
luti sint. Hi:



215. Si muscoli oris hyoidis sub deglutitione n<sup>o</sup>  
agant, scitur hoc e<sup>ss</sup>e paralyticos.

Aphago a<sup>ss</sup>oluta, a<sup>ss</sup>urgita deglutita monent  
in eo herentia, cum non tantum proprio pos.  
dege, sed motu fibrarum aphagi tum longi  
industrialium tum orbicularium in ventriculum  
protrudantur. Hic Puella ex suppressione  
mensuum cathetica in improptam deglutendi  
incidit. Bene h<sup>ic</sup> causa examinanda, ne foris  
sacchi aphagi, & glandularum dorsaliu<sup>m</sup>  
accidentur, quibus presentibus serpi<sup>m</sup> minui<sup>m</sup>  
tur deglutitio, & sepe aucto examine remota  
in dorso & collo observari possunt.

ex Paralyti a<sup>ss</sup>ura arteria & musculorum  
laringis respiratio n<sup>o</sup> t<sup>am</sup> facile habetur, sed  
tantum vox sonora a<sup>ss</sup>at.

Ex luxatione vertebrae colli; cui<sup>us</sup> quid<sup>am</sup> in  
flam<sup>ma</sup> a<sup>ss</sup> succidit, & vertebrae dorfi, cum apho.  
phagus comprimatur, neviq<sup>ue</sup> una cum medul  
la spinali, angina quasi Paralytica sepe  
oritur.

Angina Paralytica periculosissima est, plane  
L<sup>i</sup> deglutitio plene a<sup>ss</sup>ectus, morasmo cum

egri obire debet, prore climatibus. n. 216.  
entibus. egro succurrendum, medicamenta que  
per climata injici debent, eorum autem  
antiprælyticis fovere, fociare opus est & in,  
notis; Angina Convulsiva

Sæpe à nimio rum influxu musculi laringis,  
& pharyngis fræptice afficiuntur, cum suffocati-  
va molestia, & deglutitione abolita; observatur  
is in Cateno, epistotono, emprostotono malo-  
omine. in Paroxysmis chyrochondriacorum, &  
Hystericorum idem fit, sine periculo, cum facile  
captore, afa foetida, galbano, in Ol. & in rores  
intuso de malum, curetur, à sola rum attaxia  
ortum. recidiva tñ, si morbus fit sine materia,  
ex debilitate nervorum ortus; cortice Peruviano  
præcaveri debet. cum tñ egri in Paroxysmo  
frigerant, quoties extrema parvis calidis; for-  
core, pedibus lateris calefactis, oppliore, clima-  
tibus, alium solvere, interne propinatis, opiat-  
rum notum frenare, superbibendo potus  
calidos.



219. Sic Hysterica globum quandam in faucibus se  
habere putant, cum convulsi masculis faucium  
aer elastiis rarefactus, intrinsecus, prorexiens  
imobilis. suffocante quasi mortua incepto  
totaliter atrox in Pulmones, convulsi masculis  
laringis, ingressu, reviviscunt. In. glandos  
In mobile, et sensibile genus nervosum Hysterica  
possident, ut sunt a fortiori odore grato. Paro-  
xismum incurant, ita acrioribus antihyperi-  
cis ceduntur, cum plus commoveantur. In. se-  
missime a man circa praecordia torcente Hy-  
perchondriaci, et Hysterica Paroxysmos incurant,  
suffocatiois, sive, et vomitu excussa man  
malum cepit.

In Angina aspera arteria et laringis, nullus  
apparet tumor, neque interne in faucibus, neque  
externe in collo.

In oesophagi inflammatione aequa nullus tumor  
conspicitur.

Faucibus inflammatis, aperto ore, et lingua  
depressa, aliqualis rubor, tumor observatur.  
in inflammatione veli, tonsillarum, nonnulla  
facile malum videtur.

In acutissima angina cum respiracoe suffo<sup>218.</sup>  
cativa, anxietate, spuma oris cum pectore  
lethali; stagnat enim sanguis in pulmone, in  
loca obstruita uoluit cum impetu, prae  
seperum spum in vesiculos. Pulmonales, cum  
excessu nequeat, collectum sanguinem, ore cum sp.  
tore euacuat.

In inflammacoe Tonsillarum, veli spuma et  
mau viscida apparet; lethali non est, ob irrita  
tationem enim maior copia sanguinis secretur, quae  
in Angina Catarrhali Tonsillarum, veli, uulue,  
copiosius maau viscida secretur.

Saluae periculis in Angina, pessima, lethali,  
a humore enim vena comprimuntur quidam, et  
sanguis, ut opilectum pulmonem circuli in  
peditur, in capite stagnans, copiosius in glan  
dulis Salualis apparetur, sequitur copia  
saluae periculis.

Foris, Dna, infans aegro emissa, lethale, idem  
sit in strangulatis, et anginosi aegre suffocatione  
obcurrunt.

Si in acutis muscoli laringis, et pharyngis con  
vulsantur, cum respiracoe et deglutitione laesa,



219. sine ullo rubore & dolore confusio, lethale.

Angina epiglottidis, pharyngis, musculorum  
oris Hyoidis, per metastasim man. depropta,  
in Anginam laringis, a presa ostiis transit,  
lethale. Tunc deglutitio fit liberior multo,  
at suffocatio accedit major.

In Angina sine ullo dolore confusio, si  
humor extra vergit cum remissione symptomata-  
rum respiratoris & deglutitionis, febris, bonum.  
sine remissione symptomatum vero periculum, auge-  
tas enim inflammatio.

si humor externe ostii cum rubore, dyspho-  
ria, repente dispareat, & sensus prior suffoca-  
tio, & deglutitionis difficultas redeat, lethale;  
man enim sede jam mota, sensu in priorem  
locum per metastasim depropta est.

si in Pulmonem, derelicto loco laringis &  
Pharyngis, malum cum pectore signatur, lethale.

si humor & rubor externe apparere incipit,  
neg. si respiratio & deglutitio levetur, lethale,  
inflammatio enim ad externa extenditur.

Quandocumque repente levatur respiratio, &  
deglutitio, ab man sede mota in varios partes

per metastasin deponitur, internas & externas,  
bono & malo omine. 220.

### Periphneumonia Vera

Quum inflammatoria suppurandine incombis sanguis  
in arteriarum Pulmonalium angustis. Hæret  
Periphneumoniam efficit. Jam

Vel vasa arteriosa ex dextro ventriculo in sinistram  
sanguinem ducentia inflammata, et periculosissimum  
est, quia ad vitam necessaria est sanguinis ex dextro  
corde per arteriam Pulmonalem in sinistram circula-  
tio.

Vel hæret sanguis in vasis arteriosis bronchiali-  
bus, quæ supra bronchia ferunt et nutritioni  
Pulmonum inserviunt, et minus quidem periculosa,  
quia hæc contigua arteria pulmonali premitur,  
et bronchialis arteria cum pulmonali per anastom-  
osam communicat vide Quæstionem, facile malam  
Pulmonali arteria communicatur.

Vel in lateralibus lymphaticis ex arteriis orti  
errore loci: omnia enim viscera elaborantia humo-  
rem habent arterias pro nutritione sui, sic hepatis,  
lien renis, præter convergentes, habent arterias  
nutrientes.



Causae.

Præter causas inflammationis in genere, sunt:

Aër humidus & humido-caldus, vasa relaxando.

Aër frigidus constringendo vasa, et sanguinem densando.

Vapores terræ, vini fermentantis, vapores ex

putratis chyminis acres, qui constringendo, et  
faciendo vesiculas aëreas et asperam arteriam fa-

ciunt ut homines infirmos similia morbi ca-  
dant, sed quidam evadunt mortem, tota vita saepe  
astmate incurabili laborant.

Aëris effluvia adstringentia inspirata, quae saepe  
in aëre ab his astmatibus factis, post mortem vesti-  
culis pulmonalis lapidis, qui saepe despicitur,  
sunt, plane inevitabiles.

Chylus crassus, viscidus, crassus, quare post passum  
in abesse diffusus, quare etiam debiles, cachecticos,  
Phthiricos post passum dixerat.

Cursus validus, sanguis enim accensus et rari-  
factus ad pectus ingreditur, plane si simul frigida  
aure, vasa constringentia, inspiratio accedat. Si  
valido cursu, plane aërio tempore, febris putri-  
da excitari potest.

iniquitas pectus frigidi corpore aëstante non  
subito congelantur mollescent sanguinis rarefactio.

222.  
Clamor, cantus, tuborum inflatio, cumulat<sup>ur</sup>  
enim sanguis in corde dextro, cum per pulmo-  
nem transire nequeat, quare inflantibus tubis  
facies rubet, oculi lachrimantur, cum vena  
capitis in cor dextrum sanguine oppletum se  
evacuare nequeant.

Terror, qui constringendo peripheriam, sangui-  
nem ad interna repellit, qui cumulat<sup>ur</sup> in  
pulmone, unde anxietas, suffuria corpus pallid.

2. *Ins.* Gravindia, quæ sanguis minimum comove-  
t. Angina, ær dilatare debet Pulmonem,  
ut per eum debita fiat circulatio, in angina  
vero angustata a pressa aëria, ær pulmonem  
debiti ingredi nequit, quare cumulo sanguinem  
in pulmone colligito neque est.

Plevitis, ob dolorem enim fronte dilata-  
tionem Thoracis cohibent, quare seipso suffocant.

Si Arteria Pulmonalis, ex uno corde in  
alterum sanguinem ducens obstruatur, tantum  
hemior sanguinis pars ad sinistram cor redit,  
quia sanguinis molleinte nisi valida pressione  
sphericam figuram mutant, intersticia illigunt,



vix pro adimplentur, quod exprimitur; cumq;  
 sanguis per vasa obstructa transire nequeat, per  
 vicina aliorum fistula cum attritu. Sanguis in  
 corde dextro accumulabitur, cum pertransire vasa  
 obstructa nequeat, cor sinistrum proinde sanguinis  
 accipit, perum qd in aortam reddit, & caput,  
 quare deficienti secretionem suam debilitas, cum  
 pulsu parvo, molli, intermittente, inaequali, &  
 palpitatione cordis. cor dextrum enim oppletum  
 est sanguine unde palpitat, sinistrum patitur qd  
 defatam, unde pulsus intermittens. Pulmo  
 intrin sanguine oppletus, quare respiratio  
 parva, frequens, difficilis cum orthopnea. cum  
 vesicae pulmonalis a distensis vasis premantur,  
 ad se mutuo precluduntur, & vixit, &  
 minus affertur aortam nactis illius. cum  
 latro, unde ex aëre allis, in pectore prepitur.  
 aë perit costibus expulso ob attritum sangui-  
 nis rubor facies, oculorum, quia caput, vultu  
 per cor dextrum oppletum sanguine exonerare  
 nequeat, sequitur suffocatio. accidit huiusmodi  
 ante mortem, ut undam amplius anxietatem  
 sentiant aëri, ab extrema frigida, ungues lividi  
 pulsu parvo, altissimo, intermittens, mortem infere docent.

Si uterq; pulmo inflammatur mors inevitabilis sequitur, neq; enim suppurationi locum habet, suffocatur enim anteqm huius sequatur; gangrena aliunde lethalis est. vasa obstructa premunt vicina, unde inflammatio augetur.

Febris q; acuta urget, gravitas, anxietas; sepe dolor mediastini, Pleurae, cui non raro accessit Pulmo, irritatur enim Pleura a pulmone inflammato. Si sanguis venosus a capite in cor dextrum se exonerare nequeat, simul ab oppleto cubu agra hebet, neq; dolorem sentit, quiescit adeo exilis, modis undosis, a defatu sanguinis in aortam pulsus. Si a defatu sanguinis Pleura Peripneumoniae similis Pleura inflammatur Pleuro Peripneumonia dicitur, adeo dolor acutissimus, gravitas, in Peripneumonia tantum obtuse dolent, cum gravitate et anxietate; uno pulmone affecto, in uno latere gravitas, adeo, si uterq; in utroq; sentitur. magnitudo vero inflammacionis. Dolor febris, et symptomatum magnitudo. Simil q; Pleuritidi, Peripneumonia succedat ita Peripneumonia Pleuritidis autem potest esse tum lethale.



225. Quis jam omnes aliae inflammationes,  
ita Peripneumoniae &

Resolvitur, si aetia bronchialis inflammatio  
sit, & quoniam propter compressionem, Pul-  
monalis affata, in iis, qui vasa laxa, & spon-  
ginem non adeo firmam possident, in la-  
tioribus enim vix resolvitur. quare non  
solvitur benigna resolutione, at frequentissime

Per Sputa, dum ingratum in vitale  
in pulsem mutatum, cum in sane indolentiam  
revertitur, hinc arinlen cum sanguine sine  
noxa regreditur, per extremitates Aetiae bron-  
chialis dilatatas, in affusam aetiam inton-  
ditur; extremitates haec, alia vasa exhalantia,  
in affusam aetiam humidum pro lubricatione  
affusa aetia succumbit, oriuntur ex bronchi  
alibus; per haec fit sputum, in Haemoptoe, in  
sanguine. etiam in Phlegmone, in quibus  
in sequis ab erosione sputum coarctum oritur.  
si in corryza humida membrana nasum  
inflammata, nam viscida glava, cum suis  
sanguineis, sunt bono omne. in Catarrho  
Pulmonis seque, sine inflammatione, sputa

viscida cum stolis sanguinis educuntur. 226.

Symbium autem quoties librum, ut in  
cum molestia educatur; initio ortum, quominus  
citius accedat, ut testis, quoties eo melius, copio  
2 sum, flavum cum stolis sanguinis, sub crassum;  
Vidi ego sequis agro, fructu, partes sanguinis co-  
gulati cum mucis viscidissimo, iscirpe. cum  
levamine; sunt enim in velle tenuior pars  
sanguinis, per exhalantia in asperam ostiarii  
protrahitur, in qualem per similes in mutati;  
unde fructum stolis sanguinis, rotatum, ita  
majori inflammatorio impetu, ruptis his vasis, ma-  
jori copia sanguis peris in Tracheam ex cerni  
potest, qui, mora coagulatus, excreatur dum  
cum sanguine in qualem mutato, dum  
mucis tracheae secretis, & in laseos ejato.  
Symbium hoc si non plus, saltem materia  
puri analogae esse videtur, licet enim ad  
suppuram requiratur, ut vasa sunt contrahuntur  
obstructa, id, hic non fuit, in quod quandoque  
meam in sanguine in gas degenerate, licet in-  
2 cules cum sanguine.



Sputo autem bono omni procedente, de-  
bet respiratio difficilis, gravitas, color minimi,  
cessare sensim; et pulsus infurgere in plenitudi-  
nem, qui ante parvus fuit. denique via aperiri  
aeritati per Pulmones; si enim sine Erythra  
Sputa contingant, mala sunt.

Urina cum sedimento albo, subrubro &  
Alvi fluxu bene solvitur, ad respiratio huius  
evanescit critica, si Symptota Pulmonis inflammati  
sensim remittant; alios diarrhoea in Pleuriti-  
de, & Peripneumonia, infertur initio  
de sputo jam procedente bono, ex aliis causis,  
ut fabura primorum viarum ante morbum  
preexistente; Alvi morbi in statu motu, exor-  
ta, mala, revolvit enim motum sanguinis  
a pulmone, quo natura in Thoracem impetum  
proferre satagit; et sputum supprimis, hinc  
naturam in salutem egisse turbat. in Thoracis  
lani nihil juvante remediorum vi, solo  
dispendio ex 3<sup>o</sup> elab. dispend. sustuli.

Ad autem huius viis solvatur Peripneumonia,  
debet impetum in bronchiali horre

artia, & primum Pulmonalis affecta. Spe, 228.  
prospicitur cum febre moderata, calore equali  
per totum corpus, qualem in morbi, & plerumque respira-  
tione non adeo difficili, gravitate non nimia.

Hæ evacuationis autem plenarie morbum  
non solvunt, nisi simul & critico sudor uni-  
versalis copiosus maneat. Si vis paucopinto  
procedente ad extrema redactus, die 14. sudore  
universali copiosissimo quasi repente revixit. qd  
non ingratum attenuatum, dum nunc morbo  
genitas, sudore universali educi debet e corpore.

Suppuratus quidam, si nec benigne resolvatur,  
nec per furta, &c. alium, sudorem, metamstasem  
in alios partes, ingratum deponatur; nisi  
vehementissima sit, in artia pulmonali, &  
plane in utroque pulmone, & subito suffocet. Si  
jam suppuratus sit vomica seu abscessus, aut  
saccus pure plenus, qui in arte, & fronte, parte  
acri facto, membranam cum acerbis dolore erodente  
rumpitur & in apertam arteriam & cavum  
pectoris, unde ingruat.



Si q̄ intra 14 dieb, uno tenore procedens,  
non v̄o recidens, per finta, alvum, & am  
sudorem, & metastases in alios portus, cum  
euphonia non solvatur, Abscessus ex p̄stom-  
2 duis. Pulmonalis autem artēria inflam ab his  
ad abscessum non devenit, sed brevi suffocat,  
deo ut abscessu terminetur, fit bronchialis.  
obstructa, & Pulmonalis leviter affecta. Si  
q̄ 4to die nullum fructum, & alia evacuationis  
incipiant, melius est suppurationis, nisi Peripneumonia  
monia sit levis, sine magno aestu febris, in  
corpore phlegmatico, tum enim duntaxat. Siccitate  
potest, anteq̄m fructum, & alia evacuat in hōie,  
cum naturalis febre, hinc aucto motu m̄am equal  
pro ergo major motus, citius m̄a coarctatur, nisi  
vehemens, p̄, & gangrenet.

Si iam ingratum, mutatum, vi vite in Tra-  
heam profundatur, Tussi ex p̄stom solvitur, si  
verō m̄a attenuata in v̄nas transiit, cum quasi  
involunta reddita cum sanguine sine nova crim-  
lari nequeat, per alvum, & sudorem evacuat,  
si non sit adaptata vasi Ductu, autis, in  
2 Reptorum Secretoris, per metastases in

alias partes deponitur; ad hoc factis, Sc.  
 - bene Sympt Pulmonis affecti remittit, si  
 - si procedente evacuatione, si enim eadem  
 permaneat & augeatur, periculum est.

Frequentissime autem fructo solbitur dum  
 sanguis arteria bronchiali impetitur; & multa  
 - in maiorem puri analogam, in vasa lateral  
 dilatatur, in agram arteriam, patentia, multum  
 - perentia intat. si enim in initia venarum  
 arteris continuatur intat, in sanguinem per  
 - venit, variis viis e corpore educi debet.

si fructum album, subflavum cum stris, son.  
 - gineis copiosum procedat, pulsus ante peris,  
 plenior fiat, bonum, via enim sanguini per  
 - pulmonem aperitur, ut ad cor sinistram redire  
 possit, hinc & deterius, si adfuit, ob impediri  
 - tum sanguinis per venas jugulares, e capite  
 regressum, ex quo in cerebro stagnationem, remitt

- sit. fructum vero rotundum, viscidum, sine stris,  
 & remissione symptomatum malum, multum  
 - enim trahit, calore insipidum educi deperit.  
 - tur.



Intus suppurationis signa sunt, cum  
in inflammatione ostiis bronchiali uno tenore  
procedente, non usò recedente, nulli viri  
per dies 12 & 14 soluta, Febri scilicet angustis  
suppurans dicta, horripilos levis, sine hypo-  
remittentis, sine causa externa, egeram pro-  
hendant, quae maxime observantur, cum sup-  
puratio partes membranosas afficit, vasaque  
circa partes membranosas resistentia inflammata  
suppurat, et omnia incipiunt. dolor, si ad finem  
remittat, diffiniam si maneat, imò cum tumor  
suppuratorius increscat, augescat, quod et  
labia rubescant, ob impeditum venosi sanguinis  
in capite regressum in cor dextrum.

Vomicæ seu abscessus adeo, si signa di-  
ta essent, maneat in supposito, huiusmodi  
mucus a parte arteria ejicitur cum molestia,  
refractus est parvus, difficilis, a vomica premente  
pulmonem, quæ post motum partem ob condum  
chylam augetur; sicut in latere affecto melior  
quam opposito, quia a vomica aliter pulmo

promitur, febris lenta, Lethia urget, post 232.  
natum, ob novum chylum sanguini affusum,  
exacerbata cum siti, ob nimiam generalitatem in  
sanguinem resorbentem eamque colligantem,  
unde sudor nocturnus, tum ab acrimonia  
puris, tum chilo sanguini non bene assimilato,  
2<sup>o</sup> to, ob Pulmonem affectum, chylus enim saepi-  
us, & sero, levior est. Quia ad concussione[m]  
viri frumentum diu retinet, cum chylus  
non assimilatur sanguini, ideo Quia viscidum  
in se continet, nalis enim Quia concussa, frumentum  
cito dimittit; pallor, macies, Lethia.

Si inflammatio utrumque Pulmonem occupet,  
mors sequitur, antequam suppuretur.

Si Abscessus neque ruptus, neque puri resorbentem  
variis viis eximitur, neque in alios partes per  
metastasin deponatur, agrum post magnas,  
& diuturnas angustias tandem suffocat.

Summitur abscessus fronte, & puri v. lente,  
serpente per tracheam supi, exornatus, sique  
bonum sit, agri sanantur, licet quandoque  
pure etiam educto ulcus consolidari nequeat,



293. cum continuo in faciem humos affluat,  
qui mora corrumpitur, et rodit, serpuit;  
quos per annos sepe duras puris ejctio,  
donec phthys pereant; hī juvenis puris  
excreavit, minuta puris copia, sequela  
est dolor acutus in pectore cum febre,  
per aliquot dies, pure excreto, et sporant  
omnia, idq. alternatim donec obiret.  
vomicis hic pulmo obsepus erat, quorum  
una post alteram suppurabatur.

¶ Pur subito in apertam arteriam  
ruit, cum via aëri Pulmones dilatanti  
degetur, aëri suffocantur.

¶ rupto abscessu puris in cavum Thoracis  
mediastini effunditur tum subito aëris  
levamen recipit, et Empyema sequitur,  
sq. Paracenthesi puris aëre, album, foetoris  
expers educatur bonum, sensu lethale. Si  
vero puris in cavo sibi relinquitur, aere  
factum erodit diaphragma, imo hoc jam  
perforato ipsum Lepor v. hienem, hī in

234.  
sinistra parte sit, varias fistulas format,  
etiam usque ad externas. primum quoniam do-  
lores oriuntur dum primum aere factum, dia-  
phragma, pleuram, costas rodit.

Saepe observari vomicias. Pulmonum clam  
latentis, febre aliqua sanata, repente sine  
omni causa in suppurationem migrasse cum  
dolore, dyspnoea, si non ruptionem in  
cavum innabatur, tussim, alios. Sinituram,  
dianem, repente cessasse, mala omnia,  
obire enim acri, quidam lypothymia,  
fors rase aliqua major erosio rupto forami-  
ne eructante in cavum. quibus vero tussis  
a vomicia puerente orta, non cessavit, et  
maam per se in quiescentem, aeternam, bonam  
exceperunt, brevi evasere.

Quandoque nec per puncta, Dnam, alium,  
sudorem solvitur, nec suppuratione, ab materia  
impurata subigitur, et quia quasi analogia  
in venas transit, deponitur per metastasim  
in alias partes, ut ante, cerebrum, hepar  
et ibi vomicias format, bono, malo



235. eventu. Si verò ex abscessu pus resorb-  
tum in aliis partibus digeratur malum,  
pulmo enim ab abscessu non liberatur.

Pleuripneumonia levis, sine multis, et  
gravibus symptomatibus, benigna resoluti-  
one curari potest.

Gravissima vero, cum gravibus symptoma-  
tibus, febre et brevi occidit et in abscessum  
transit.

Mesidia naturalia, per septa, alium et  
metastasis solvitur. medicus nec est qui  
non horet in arteria Pulmonali, cum hec  
sepe semper suffocet, neq. tam facile in suppu-  
rationem transit, sed in arteria bronchiali,  
et pulmonalis parum est affeetas. Cum jam  
maior subacta, pueri quasi analogi in venas  
transit, circulator cum sanguine, cum quo  
sano sanguini assimilari nequeat, neque  
ita adaptatas sit, ut vasa secretoria Ductu  
intestini, cutis penetrare possit, depo-  
nuntur sive in Parotidibus, et circa homo-  
mine, formatz statim sine proceden-

de inflammatione, abscessum; si in hepar 236.  
deponatur, malum est, tum hepar dolet,  
inflamatur, cum morâ angustia: unde  
postea transire nequeat, formaturq; ibi  
vomica lethalis; Quia Ductuli peperi  
sunt ieterici, ob impeditam bilis secreti-  
onem. qd critici tales abscessus debent  
fieri in Parotide, crure, inguinibus, non  
in internis visceribus, ut Hepate liene,  
Cerebro, & Symphyse Pulmonis affecti debent  
minui sensum, & aporem, ut anxietas,  
febris ac. talisq; metastasis tempestive  
fieri debet, alias metus est, ne ex abscessu  
jam facto pus in viscera & interna &  
exteriora deponatur, malo omine, cum  
pulmo vix toto pure liberetur, nisi fors  
in totum pus ex abscessu ad posteriorem  
vilem deponatur, & sentiat omnia Pulmon-  
is affata symptomata.

Si vero talis metastasis, sive ex abscessu,  
sive dum impartum peractum in venas  
transit, fiat in alia parte, præ levi  
mine prothrombonia, pessimum, copia



239. enim mac indicatur.

Metastases go. sive ex abscessu, sive  
mac in venas intrusa, ad curia, inguina,  
parotides, et partes ignobiles, cum ephora,  
bona, levatur enim pulmo. At malum.  
ad metastases in partes nobiles, hepar, est.  
tum, gepina, formatur enim ibi. vom.  
ce, juvenis febris. dolor partis, delirium,  
sopor, convulsio, hinc sive remittens  
syngis Pulmonis, sive non, lethale est.

Quandocumque benigna resolutione, neq.  
per sentas Enam, sudorem, alium, neq.  
per metastases in alio parte, neq. per vomica  
per abscessum terminatur, sed infarctum una  
cum vasis in tumorem calidum, et scirrhosum  
mutatur; ad quem v. lenta, et atrabiliosa  
sanguinis constitutio, v. nimia venesectionis;  
quae faciunt ut motus febrilis ita languet,  
ut infarctum neq. resolvi, neq. solvi. Sensus  
vasis in suppuraem mutari possit. Siffronius,  
quod data vita orthopnea, tussis, pira, respira  
tio difficilis, notu corporis, et post partum novo,

crudo affluente chilo, aucta, divexat, 238.  
Febri tñ valida elpat, neq, lenta urget, ut  
in abscessu.

Subinde Pulmo Pleura accrescit; Pleura  
ex vasis exhalantibus tenne plocat liquidum,  
ne pulmo sub inspiracoe Pleura contiguus accres-  
cat, cum autem in eius inflammatione maneat  
Pleura contiguus, facile concrepescit cum Pleura  
potest, tunc remanet sanata Peripneumonia,  
difficilis respiracoe, praecipue post motum; si tñ  
proa partem exiguan cum pleura concrepescit,  
vix malum noscitur.

Valida inflamcō utriusq, arteriae, tam pul-  
monalis qm Bronchialis, cum febre acutissima,  
anxietate, imminente suffocatione, cōturbacoe,  
hebetudine extremorum refrigerio, pulsuum  
molli, intermittente, delirio & comate, brevi  
in Gangraenam mutatur, & paululum tunc  
sunt in externis color in pallidum, cinereum, fus-  
cum, nigrum mutatur, ita putat prodeant &  
cinerea nigra, foetida, cum morte  
breui sentiantur.



Prognosis.

Periculosa, triplementia enim, obstructio pul-  
 - mone. Hærent enim circa cor dextrum. revulsio  
 per vena-sectionis, neq. hic, quia, in magna enim  
 inflammatione, mortale sanguinis in vasa majora  
 retrograde recedere nequeunt, ob impetum a  
 tergo ex corde dextro omni momento durantem  
 tum ob valvulas cordis dextri, quare, nisi  
 bronchialis obstructa sit, pulmonalis acuta  
 inflammatio letalis est, in specie p. uterq. ve-  
 pulmo affectus sit, Sanguis enim pulmonem  
 transire non potest, accumulatur in corde dextro,  
 parum sanguinis in cor sinistrum mittitur,  
 hinc parum in aortam, cerebrum, & totum  
 corpus pellitur, venosus sanguis a capite, ob  
 obstaculum in corde dextro, redire nequit cu-  
 - mulatus itaq. in cerebro, parit magna spiritus  
 2. 3 jam die anxietas, patient agni imobilis.  
 hebetes, cum pulsu celi, parvo intermittente  
 extremorum refrigeratione a defectu sanguinis  
 in aortam p. est. rorò q. in valida inflammatio

abscessus Pulmonalis, utrinque Pulmonis 240.  
tertium diem superviunt, at ito suffocantur.

Urinae citius crassa cum leuocinefluens,  
in tenuem mutata cum incrementis symptomatum, malum.

si exusti febre in vigore cogantur, fere  
lethales.

Diarrhoea, ex abscessu & empyemate, prae  
putrido attenuata reabsorbto, cum febre  
colligativa hectica, lethalis.

si pus ex abscessu & empyemate bonum adhuc  
diluentibus attenuatum, reabsorbting alio-  
die evacuetur, sine Hectica, cum alleviatione  
re pulmonis, bonum.

Suppuratus in pectore in thorace & feruens, le-  
thales.

Peripneumonia in corpore laborioso, ob  
densum sanguinem, fere lethalis.

Hæmorrhagia parotearum guttorum, mala,  
depernat quidem injecta rupta vasa nasi, sanguis  
in ob coarctationem sui exire nequit, plerumque  
rivalis.

Peripneumonia debilitato Pulmone, ut aphrasi, phthisi &c.  
accidens lethalis.



247.

manile in pectore rubra, brevis livida  
 & les, ob gangrenam, lethales.

Coryza, & sterutatio accedens, malum,  
 dum ob impedimentum aëris, propter membranam  
 tumentem, per nares in Pulmonem ingressum,  
 dum, quia sterutatio inflammatur Pulmo valde  
 concutitur.

Peripneumonia febris ardenti succedens,  
 lethalis, cum in ardente febre in toto corpore  
 inflammatio sit, quare Pulmo fusco sanguine in-  
 jectus, & in gangrenam & suffocationem  
 terminatur.

Sputum biliosum cum paucis sanguine  
 bonum.

Biliosum cum pure prope optimum diem,  
 sine expectoratio, malum videtur enim ex  
 quibusdam vasis idus plus est, dum in se  
 nova inflammatio succedens, sputum biliosum  
 producit.

Valde cruentum malum, maxime statim  
 initio ob rupta vasa ingreditur febrili.

Flavum, finisum, album, rotundum, ma-  
 lum, mucus enim dantur, ex vesiculis pul-  
 monalibus rotundis, calore inspersis, eductis,  
 est tale sine levamine, sine stris sanguineis.

non autem maa infarcta, ideo est sine 242.  
eophoria.

putrefactum putum, reprimum, tennem  
enim muenum cum alio missam indicat,  
nisi sensim mutetur, et infarctum excrebitur.

putum fufum, coenofum, amurofum livi-  
dens, nigrum, inagle, druziofum, gangrenam  
inducit. quodam in putum lividum, nigrum  
educitur sine periculo, dum effusus in Tracheam  
sanguis, coagulatus: excreatur cum maa parva.  
Aestas, quod aliquoties vidi.

Pulsus deficiens, extremorum frigoris, pectus,  
caput, collum aestuans, gena rubentes, liventes,  
lethales, ob eos dictorum sanguine oppletum,  
sinistram vero fere vacuum.

### Curatio.

Inflam<sup>o</sup> levis, ubi spes resolutionis benigna  
cam solvi prope, vendicationes multe non  
requiruntur; quos sit corporis, ne in pectus us-  
queatur sanguis. vapor. & tepida & deorib. emoll.  
ore tractatus sepe, ut vasa laxata impatum  
transmittant. pedes foviantur vapore, epithema,



243. It, per iluvio liquido, ubi pectore revellatur  
injetos.

interne Scam lactis, lac & Silibum Scott.  
Hord. aven. alth. Scorpion. gram. si pectoral.  
cum melle rob sambuc. Cum oxymel  
theata The German. Pectoral. calice. frequenter  
sorbellata cum melle, si. Pectoralibus. et  
conveniunt.

si solvi incipit per fuenta sanguinea, san-  
guine non mutata per anastomosi vasorum  
lateralium in Tracheam inijecto, cum leuornia,  
decoct. emoll. c. tenuissimis agitentibus, cum  
melle, si. 5<sup>to</sup> radii. agitent. si. alth. Semell.  
lactis c. & theatis ditiis. Liquidis, cum si. pector.  
oxymelle succit. si. fuentum viscidum cum  
moleptis, & quisi quodam pectore, Bucatur,  
insufflendum.

si alvi fluxus criticus, cum euphonia pul-  
monis solvatur, praeter dicta desinata ex  
lacte melle, vitell. ovi, decoct. Hord. c. si. Alth.  
item Cataplasma. emoll. Abdomini applicata,  
ut man. laxatis vasis in abdomen scrivetur,  
conveniunt. cave ne abdomen refrigeretur,  
alios dioscorea salutaris si. pectus.

Si per 12 crasam, sanguinolentam cum 244.  
levissime, tamen Silvestria valet, penitus  
vero topica emod. cataplasm. linimenta  
ut vasa relaxata magis citius transmittant,  
applicandas. interne Silvestria, cum lenibus  
Osmethis: ut scum latis cum salvia, roseo.  
barri alkifens, yerosel. de.

Cave, cum fructu, alio, 12 ras. solvi in  
cipit, a venditione, purgante.

Peripneumonia magna, recens, quae vixit  
prope, sed suppurari debet, requirit venosi.  
horem largam, si si ingta non levatur  
regulitiam, levata yingta, si denno recidit  
cant, denno sicut vena, non in 3 anni  
deliquium usq, ne cor pueretur sanguine,  
huc curabile scapitate, forte, variis. cor.  
poris prothibus. opposita sicut scapitate  
vellendi a parte, latis vena sit in manu,  
etiam in, menstruantibus. hemorrhoidibus,  
quibus in prius. in pede scapitate, tandem  
in manu. sub actuali. plura sanguinis  
ex vena, curabile scapitate. genibus  
applicari possunt.



245. Si extrema frigiditas frigida, pulsus  
debilis, celer, intermittens, parvus, quod son-  
guinis primum infarcto Pulmone. In  
hortum propii. dorent, vitetur benefutis,  
ne ultimum sanguinis, qd in cor finistram  
aditus transsit, coarctetur.

In accibwinte Peripneumonia, can-  
tequam finitum corbum cum levamine  
procedat, andantes seclus venae.

Sape enim Peripneumonia, Pleuritis  
prehendit corbum, ante insipientia, cum  
gustione mae flave, imo quidam sanguis  
volentia, si non primum ante Hemoptysin  
fuerant, tum initio casu bene examinato  
vena secari debet.

Pulmone vapor deijetur. trahatur, decorta  
the hermon. flo. propar. thead. Decort. oral.  
decort. fortibentur collidat cum melle, syr.  
Pectoral. aptum formum. Osa deperant,  
decort. item. Loni. avena di.

Quia vitetur, ne supinofacto infu-  
non sentientur stimulum, a mae collidat  
evamanda seclatu, suffocentur.

Si fructus viscidum minus difficile exeat. 246.  
atque, oxymel / grail. convenit, si vero plene  
supprimatur cum auctis / symptomatibus, quous  
resicatoria opposita juvant, praeter vapores  
legidos pulmone turbos, theata calidiora,  
et saepe dato ad gr. ferre min.

Diasthma symptoma diacord. thetaria  
colect. item clismat. ex diacord. ac / pissa.  
tas.

Si ad utrum v. cum diu, sine incipiente  
corhone, et evanescione praesentia ei, febri, aliisq  
symptoma fuerint, signum ad expectanda, dum  
absque neq. suffocantur, v. cupit regredi in  
tractum obcurat, cupit interne Emphyema, et  
obitus sequitur. in tali febre suppurationem  
non valet venesectio, cum ad suppurationem  
requiratur, ut motus neq. torpeat, neq. minus sit,  
qui novam inflammationem in vicinia producat,  
venesectio itaq. in motu sanguinis temperato no.  
cum plane torpidum efficiendo, si in  
summa oppressio, et motus humorum minus  
eam postulat, parca fiat, et quovis modum



244. Levatur Pulmo, vena claudenda, levanda  
q̃o oppressionis, & minui motus febrilis gratia,  
celebrari potest.

Externis Cataplasmatibus, internis emollientibus,  
medicis silentibus naturæ absepsus.

Absepsus factus, pro concilietur exitus, nova  
cum acinis factum pulmonem rodet, &  
reabsorbendum Caecothonium, peralutissimum son.  
& quini inducet.

Optime si in Tracheam Lentæ, non repente  
aliis suffocatus sumptus, ut pus secretum sensim  
educatur, interne ruptis, pus effundet in  
cavum Thoracis & mediastini, fitz Empyema  
fere lethale. quare incipiente purgatione  
vapor deinde pulmone trahatur, ut emolita  
membrana vomica citius in Tracheam sumptus  
ita perendum per diu s. dultia. Formati  
absepsus pro concilietur exitus, q̃o Inpsis  
artificialis exitetur, oxymelle calido, vino,  
oxymell. Spid. ut sumptus in Tracheam vom  
cat.  
Necesse quidem est ne absepsus comprimens  
vicina novam pariat inflammationem, cum dolore,

efflore; item ne rupto subito abscessu, pus 248.  
effusum in Tracheam suffocet; ad non raro abs-  
cessu tumente suffocantur acri, anteqm rumpatur,  
idem se rumpatur in cavum unde empyema, sed  
pus tritius retendum acri fit, rodit membranas  
cirgerentes cum dolore summo, reabsorbem lectionem  
Chrysipin lethalem inducit; quare opus est tempus  
tunc, anteqm aere fiat, ut, summo prius insensu,  
ut essentia ventriculo impediatu defensus diaphrag-  
matis, pulmorum comprimatur, melioris ita ruptura  
fiat; visu clamore valido, inspi, vapore acri  
exaltata vomitu, unctione per inaequalia loca,  
rumpatur vomica. Ante mortem, iniectionem reme-  
dium opponendum.

Si pus jam acri facto rumpatur fronte vomicae,  
in Tracheam & in cavum obcurrat certo, erosae  
omni sunt omnia, quare ulcus insonabile re-  
manet.

Si solum pusculum laudabile, nonfectu-  
dem inspi evacuat, cum lavamine, remanet  
dein cavum, quo pus contriebatu & ulcus  
mundandum, ut vasa in cavum hiantia semi-  
mortua, putrescentia, sordida separentur, ut ita



Utg. porietur mundi mutuo concreuant. Lac.  
c. v. silturan. c. lacte, decort. Ror. avenae,  
oryzae, decort. chamaedr. crysimi, leb. v. veron.  
subios. agrim. ac mundant, detegunt, pus  
realforbum i sanguine eluunt. febris autem  
lentae sit ratio, ne calida detergentia, hoc puer  
fente adhibeantur.

Si frusta minimi incipiunt, neq. oppressio pecto-  
ris adsit, quae docet sputum retineri, sint  
Consolidantia in usu, ut Tussil. Pulmon. Hyperc.  
misch. oliban. sericicoll. Thesebind. Paeon.  
peruvian. co. viride, crocus. dr. nisi hebraeas,  
lentae horum usum prohibent

Tussis siua, affusa, quatis solitur, hoc enim  
consolidatio ingreditur, dato opiato pus coquatur  
& mane facile excreatur. ne in majori dosi  
qui tussis supprimatur, sequente anxietate  
cave, tum enim vapores & deinde, oxymelle  
revocanda esset, & oxymel. spid. in Phrysi  
magni sunt usus opiata.

Si vero Pulmo levetur sine ulla Crisi,  
signum est ingratum in veras transisse  
cum mutatum jam, sanguini sano assimili

neglectat, sentur lenissima stimulantia, modicum  
cum vinum, lenia aromatica, ut augeatur pa-  
rum circulus, magis subigatur, attenuetur, vapor  
pulmone tractatur ut inepta solutio pascat,  
vasa relaxata facilius impactum transmittant,  
& attendendum, quibus viis nāa noxam evacua-  
bit, an  $\square$ , an alio, an id per metastasim  
in alia loca deponat.

si ad curam Parotides, & inguina, possit dolere,  
inflamatur, irritetur affluxus cataplasm. emoll.  
frictione irritatōe c. sen. frangi, cum m. p. p. r. i. s.,  
tota m. a. deorsum statim agnoscatur abscessus,  
cum pus non sit in his partibus ex inflammatione  
ortum, sed concolorum, circulus cum sanguine in  
locos deorsum. Si duobus post febrem autem  
sine crisi sanatis, m. a. ad nates deorsum fuerat,  
formavit statim abscessum, q. pus in san-  
guine genitum fuit.

Quandocumque ad hepar deponitur, cum vivente  
remedio vix, format ibi vomitum, ulcus -  
cum letitia morbo. cum autem non raro,  
antequam ad curam deponatur, levem chylorrhoeam.



257. Trium tensionem faciat, hepatis quasi leviter  
inflamē, cum angustis, vnde potius pectus  
sine nequit, quare dentur interne diluentia  
leviter resolventia, sicutum, decort. Toraxacon.  
cythos. gram. fumos. c. melle, heri in fovea  
h. cataplasma. Hepat. applicentur; cumibor cu.  
inobite pectus, frictions; emplastra irritantia  
et ut illuc trahatur maa. clisinata pectus pectus  
ha, ut ad intestina sollicitetur maa, exhegale.

In Cerebrum deposita delirium, coma,  
convulsiones, causat. quare clisimatibus, pectus  
vitis, fermento acro, vesicatoris, cumibitis  
pictis, scorpiatis, scapulis appositis, recedatur,  
interna sunt diluentia.

si in Sursum transsit, insanabile, initio  
in Betus sago venetis, succus gram. c. pectus  
decort. Toraxacon. cythos. gum. amon. ac.

Pulmonis cum Pleura concretio incurabilis  
sentetur h. multis diluentibus, externis fomentis;  
o'osis simul motu, unctione.

Gangraena aliunde incurabilis. est.  
Frigore inante admisso, potu frigido, in, decore

252.

calore nimis embuili; luti; medicamentis calidis;  
Item febre nova, valida; inepte excretioni per  
sputa, superveniente, diarrhoea symptomatice  
ei. sputum jam prodegens, munitur, spargi-  
midur, cum auctis pulmonis anxietatibus, dum,  
vapores & tepida & siccat. emolliant. ore tracti, corri-  
bus vesicatoria interne callida Theata herbarum,  
& ferres minerales ac conducunt. Diarrhoea vero  
sistatur quatis, diaiodiatis. oxymel squilliticum  
superiori excitando suppressum, sputum revocat.

### Peripneumonia Hotha.

Duplexi recitat sanguis lentore, & inflammatorie fuf-  
so, cui motus valibus, & attritus. habet originem  
frigido lento, a motu ex attritu imminente orto. Talis  
lentor frigidus, necesse sepe in asthma Pulmonali &  
bronchiali, Peripneumoniam causat, cum febre  
multo leviori, nec cum tam gravibus symptoma-  
tibus signatam, cum sat facile calidus seduen-  
tibus solvatur.

Sunt jam aptas flavam bilem exaffrat, adurit,  
si fervens sit aeris temperies; Authumoris atram



252. Bilem generant, ita hyems: pituitam in corpore  
colligit, ab omni, quo dormiunt homines. Toto illo  
tempore, motu corporis privati; Vix jam pitui-  
ta collata solvi incipit, una viscidius difficiliter  
vasa pulmonum penetret. Periphraem omnium  
ex stagnatione causat; Lentos enim sanguinis,  
sive inflammatorius, sive viscidus, primo se  
in Pulmone & cerebro manifestat, cum hominem  
viscerum vasa difficiliter permeet, ut pole pectus  
omnes.

Quid jam in hoc morbo Pulmo opprimatur cum  
angustis, cum tamen nonnisi huius Phlegmatis  
corpora obnoxia sint, in quibus vasorum laxitas;  
et sanguis pituitosus adeo, quapropter venesatio  
plane repleta non confert, licet haec administrata  
angustiae levetur, cum magis actio vasorum  
in sanguinem debilitetur.

Obnoxii sunt Senes, Phlegmatici, Catarrhici,  
grave dine laborantes, in quibus a causis variis  
pituita generatur ut. de gemitoso fontaneo.  
Sic jam auctant causas, cum accumulata  
subito moventes, ut aëris, clamor, cantus, item

abusus spirituosorum, subita refrigeratio post 254.  
calorem, subito calor fori, solis &c. ut iramundia  
magna; Peripneumoniam ovari neque est,  
venosus enim sanguis, & chylus crassus pulmonem  
primo repleat debent, quare ibi stagnabit.  
sic potiores Phlegmatici sunt, longevius, cum  
adormunt, tremunt, boni moris sumptibus, vasa  
stimulantibus ad se redeant; & si finem Cachectici  
sunt.

### Diagnosis.

Oppressio Pectoris, anxietas, anhelatio, in corpore  
Phlegmatico, Cachectico, nulla & exigua febricula,  
cum vagis horridulationibus, levibus febris  
insultibus, ut nunc incalascant, nunc frigescant, Pector,  
anhelitus crescit debilitat; Una quandoque, tunc  
alias paliditas, intense rubra, & statim turbida,  
quod turbida mingitur, moxque vultu rubroposito  
selemento; conquepatus frontem diu retinet, ob  
visum gradum omniars; sub lapsu capitis, dolor  
angelus, & vertigo quod urget; ob obstaculum  
enim in Pulmone, sanguine viscido opulento,  
venose in cor dextrum evanescere nequeunt,



255. quare cerebrum sanguine pituitoso abundat.  
Salis. Peripneumonia, nisi succuratur, pef-  
cat.

### Curatio.

Anhelitus, & oppressio Pectoris, venosationem  
requirit, ut minuat copia visus sanguinis  
attribus a tergo, repetita tunc notet cum debili-  
tando vasorum actionem in liquora, pituitam  
producat; paulo vulnere educatur sanguis,  
ne visum sibi ipsi viam procludat.

Asymata quotidie injiciantur, ex resolventibus  
donec minuat oppressio, pulsusque validior  
fiat.

Olandum purgare alternis diebus purgati;  
siq. ager nimis sit debilis, asymata ex purga-  
tibus idem efficiunt.

Vultus sit tenuis, ne crasso chyle gravetur.  
Pulmo, ex jussulis carminum & succo citri cost.  
Omn, h. Hyssop. coarsa. in cortis. potus.  
cum melle.

Pediluvia, derivantia a Pulmone, in  
usu sunt.

Vesicatoria crucibus, semonibus applicanda.  
 Juxta prius venesatione, dato purgante, &c.

Deniq. curatio dirigatur ut putrida Pul-  
 monem gravans resolvatur, ut vasa pectoris  
 sic valeat, & a Pulmone revellatur.

### Corollaria.

Inde patet, cur quævis, Sceleris, post  
 morbum debilibus communis sit, ob vasa laxa,  
 temperiem frigida, sanguinem putridum,  
 minus consistentem.

Cur sæpe facile sanetur? ob vasa laxa,  
 sanguinem minus fixum, facilius diluentibus  
 resolvablem, quæ vasa infusa, Sceleris præsertim  
 solvitur.

Cur in robustis difficile solvatur? ob sangui-  
 nem inflammatorie fixum, sero destitutum,  
 vasa stricte.

Peripneumonia acutis, debilitato pulmone,  
 ut Atypis, Astmatis, ac ædema, lethalis  
 est.



257. Interne condunt, si febris nullas exiguas  
Theata lebor. Hypos. ros. f. Bae. junij.  
gum. x. oxymell. Gvill. ino in justinai  
visciditate, syz. Sabai, kermes. min.

Inflammas vera totius vasafectionem regu.  
litas requirunt, quibus minuta symptomata,  
denno augentur, aut solitas residuant, am  
bui and extendi, aut residuare inflammatum  
inducunt; cave hi a vasafectione, dum in  
pectum corbum evanescit, variis viis incipit.  
Sanguis ebullit, siccus, cordatus, et debet  
fieri denno; coarctatus, si inflammas non  
est vera, quae a crasso, siccis sanguine oriri  
debet.

Quandoque in suis inflammatumibus  
corruptionem, deest, color partibus  
exigit, nam per metastasim in haec loca  
deposita, febris est, quod si non  
est, et malum est, aut enim coarctam  
indiat, aut usque fieri inflammatum.

In inflammationibus peritonii nervosorum 258.  
dolor est acerbissimus cum pulsu duro, non  
raro lyptia, dum exteriora rigent, offus-  
sum ad extrema usque perfrigentem, et  
acutulum in extremis insensibilem, interiora  
vero uruntur, ob attribum in peritonio  
et fa. intestinis in ventriculi intestinoorumve  
inflammatione. si talis ad suppurationem deveniat,  
cessant aguntur omnia symptomata cum  
horripilationibus sine ordine recurrentibus;

Finis Tomi Secundi.



De Febris in genere	1.
Lingris Febrile	25.
Sympt. Febrilis	27.
Anxietas Febrilis	28.
Gangra Febrilis	33.
Pilis Febrilis	34.
Austus & Flatus	40.
Vomitus Febrilis	47.
Debilitas Febrilis	54.
Calor Febrilis	60.
Delirium Febrile	66.
Coma Febrile	72.
Pervigilium Febrile	75.
Convulsio Febrilis	79.
Sudor Febrilis	86.
Fractura Febrilis	88.
Exanthemata Febrilia	104.
Febris continua putrida	109.
Febris ardens	120.
Febris intermittens	134.
Phrenitis	151.
Angina	164.
Catarrhus Suffocati vss.	167.
Peripneumonia	220.
Peripneumonia Notha	252.







[ksiaznica@kc-cieszyn.pl](mailto:ksiaznica@kc-cieszyn.pl)